

Guide technique

relatif à l'évaluation de l'état des eaux
de surface continentales
(cours d'eau, canaux, plans d'eau)

Janvier 2019



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Guide relatif à l'évaluation de l'état des eaux de surface continentales (cours d'eau, canaux, plans d'eau)

Janvier 2019

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

Articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement

Sommaire

1. PRÉAMBULE.....	5
1.1 Objectifs du guide.....	5
1.1.1. Répondre aux obligations européennes de classification et de cartographie de l'état écologique et de l'état chimique pour les eaux de surface continentales.....	5
1.1.2. Fournir des indications complémentaires à utiliser pour le diagnostic des milieux aquatiques.....	6
1.1.3. Favoriser la cohérence globale des évaluations de l'état des eaux.....	7
1.2 Calendrier.....	7
1.3. Contenu du guide.....	7
1.4 Remarques concernant les liens entre l'état des masses d'eau et les mesures des programmes de mesures de la DCE.....	9
2. RÈGLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE.....	10
2.1 Données mobilisables.....	10
2.1.1. Origine.....	10
2.1.2. Chroniques.....	11
2.2 Évaluation par élément de qualité (indicateurs, valeurs-seuils, modalités de calcul (intégration temporelle par indicateur)).....	11
2.2.1. Élément de qualité cours d'eau.....	12
2.2.2. Élément de qualité plans d'eau.....	19
2.2.3 Cas des exceptions typologiques et des exceptions locales.....	25
2.2.4 Situation de lacunes dans les outils d'interprétation.....	26
2.3 Règles d'agrégation des éléments de qualité.....	26
2.3.1 Principes généraux et rôle des différents éléments de qualité dans la classification de l'état écologique....	26
2.3.2 Application pratique.....	28
2.3.3 Cas des situations de lacunes de données de surveillance.....	30
2.4 Attribution d'un état écologique à l'échelle de la masse d'eau.....	31
2.5 Attribution d'un niveau de confiance.....	31
2.6 Cas des masses d'eau fortement modifiées (MEFM).....	31
2.6.1 Principes généraux.....	31
2.6.2 Application pratique.....	32
2.7 Cas des masses d'eau artificielles (MEA).....	35

3. RÈGLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE.....	36
3.1 Données mobilisables.....	36
3.2 Indicateurs, valeurs-seuils, modalités de calcul (intégration temporelle par indicateur).....	36
3.2.1. Paramètres et normes de qualité environnementale.....	36
3.2.2. Modalités de calcul.....	38
3.3 Attribution d'un état à l'échelle d'une masse d'eau.....	43
3.3.1 Masses d'eau disposant d'une ou plusieurs stations répondant aux critères énoncés au 3.1.....	43
3.3.2 Masses d'eau ne disposant pas de stations répondant aux critères énoncés au 3.1.....	43
3.3.3 Représentation de l'état d'une masse d'eau.....	43
3.4 Attribution du niveau de confiance de l'état chimique.....	44

Liste des annexes

- **Annexe 1** : état écologique des cours d'eau - Indices biologiques pour la métropole
- **Annexe 2** : état écologique des cours d'eau - Indices biologiques pour les Antilles (Guadeloupe - Martinique)
- **Annexe 3** : état écologique des cours d'eau - Indices biologiques pour la Guyane
- **Annexe 4** : état écologique des cours d'eau - Indices biologiques pour la Réunion
- **Annexe 5** : état écologique des cours d'eau - Paramètres physico-chimiques généraux
- **Annexe 6** : état écologique des cours d'eau et plans d'eau - Polluants spécifiques et leurs normes de qualité environnementale
- **Annexe 7** : état écologique des plans d'eau - Éléments biologiques
- **Annexe 8** : état écologique des plans d'eau - Paramètres physico-chimiques généraux
- **Annexe 9** : prise en compte de la variabilité spatiale et règles d'extrapolation spatiale
- **Annexe 10** : modalités d'attribution d'un niveau de confiance à l'état écologique évalué d'une masse d'eau - cours d'eau ou plan d'eau
- **Annexe 11** : état chimique des cours d'eau et des plans d'eau
- **Annexe 12** : éléments à prendre en compte pour définir les actions et suivre leurs effets
- **Annexe 13** : remarques concernant l'utilisation des résultats de l'évaluation de l'état des masses d'eau en lien avec les programmes de mesures de la DCE

1. PRÉAMBULE

1.1 Objectifs du guide

Les règles d'évaluation de l'état des eaux de surface sont définies au niveau national par un **arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement modifié par :**

- **l'arrêté du 8 juillet 2010 ;**
- **l'arrêté du 28 juillet 2011 ;**
- **l'arrêté du 27 juillet 2015 ;**
- **l'arrêté du 27 juillet 2018.**

Dans la suite du présent guide, la référence à cet arrêté modifié est opérée en renvoyant simplement à **l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010.**

L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les données de surveillance recueillies conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement. Dans la suite du présent guide, la référence à cet arrêté est opérée en renvoyant simplement à **l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010.**

Le présent guide traite spécifiquement des eaux de surface continentales : cours d'eau, canaux et plans d'eau. Il vise à fournir les éléments nécessaires à une application harmonisée des règles définies par cet arrêté, pour les différentes finalités listées ci-après.

1.1.1 Répondre aux obligations européennes de classification et de cartographie de l'état écologique et de l'état chimique pour les eaux de surface continentales

Le présent guide vise à répondre aux exigences de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE)¹ de **classification et cartographie de l'état écologique et de l'état chimique de chaque masse d'eau**, selon les modalités suivantes :

- **état écologique** agrégé à partir des différents éléments de qualité, avec une représentation des **cinq classes d'état écologique** ;
- pour les **masses d'eau fortement modifiées**, adaptation des modalités d'évaluation de l'état écologique, avec une représentation des quatre classes de **potentiel écologique** ;
- **état chimique** agrégé à partir des substances prioritaires et dangereuses prioritaires, avec une représentation des **deux classes** d'état chimique selon les grilles de lecture suivantes :
 - état **pour l'ensemble des substances prioritaires et dangereuses prioritaires** ;
 - état **hors substances ubiquistes** (substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 de l'annexe 11) ;
 - état **hors nouvelles substances introduites par la directive 2013/39** (substances numérotées 34 à 45 de l'annexe 11) ;

¹ Directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau

- état **hors substances pour lesquelles une NQE plus stricte a été établie par la directive 2013/39** (substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 de l'annexe 11) ;
- attribution d'un **niveau de confiance** à l'état écologique et à l'état chimique, évalués pour chacune des masses d'eau.

La classification de l'état à l'échelle des masses d'eau est établie et validée par les secrétariats techniques de bassin (STB), qui associent les services compétents de l'agence de l'eau, des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et de l'Agence française pour la biodiversité (AFB). Dans les régions ultrapériphériques (RUP) à l'exception de Mayotte, en l'absence de STB, ce travail est assuré conjointement par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et l'office de l'eau. A Mayotte, en l'absence d'office de l'eau, il est réalisé par la DEAL.

Une carte de l'état des masses d'eau est publiée, deux fois par plan de gestion, dans les documents de planification de la mise en œuvre de la DCE : dans les états des lieux et dans les SDAGE. Des bilans intermédiaires peuvent être établis sous la responsabilité des STB (ou de la DEAL et l'office de l'eau dans les RUP).

Le présent guide est ainsi fondamentalement destiné aux acteurs en charge, via les secrétariats techniques de bassin (ou de la DEAL et de l'office de l'eau dans les RUP), de la publication des documents de planification, de rapportage ou d'appui à ces actions (état des lieux, cartes SDAGE, bilans intermédiaires, etc.).

1.1.2 Fournir des indications complémentaires à utiliser pour le diagnostic des milieux aquatiques

Les règles de classification de l'état des masses d'eau permettent de répondre aux exigences européennes et nationales en la matière. Elles fournissent un indicateur synthétique d'objectifs et de résultats de la politique de l'eau en matière de préservation et de restauration de l'état des eaux et des milieux aquatiques. Cet indicateur intégrateur constitue un outil de pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques, ainsi qu'un outil juridique, adapté aux outils de la planification DCE selon les calendriers qui leurs sont associés (cycles de six ans).

Porter un diagnostic sur les milieux aquatiques nécessite de prendre en compte ces règles mais également des éléments complémentaires comme les informations relatives aux pressions, et d'autres paramètres, valeurs-seuils et outils d'interprétation des données milieu (analyse des tendances temporelles, etc.). Un tel diagnostic peut être réalisé afin de :

- consolider ou affiner la connaissance de l'état des eaux ;
- identifier les principales altérations du milieu et les pressions en cause ;
- identifier les mesures à mettre en œuvre, puis évaluer leur efficacité.

Ces éléments peuvent servir tant à mettre en œuvre la DCE qu'à répondre à des objectifs de connaissance et de gestion locale.

Pour évaluer l'efficacité des programmes de mesures, il est en particulier nécessaire de distinguer, en complément de l'état écologique et de l'état chimique des masses d'eau qui constituent l'objectif de résultat, des indicateurs et autres outils montrant l'effet des actions mises en œuvre qui soient plus sectoriels, plus spécialisés par domaines d'action et de politique publique (réduction des pollu-

tions issues de rejets ponctuels, des pollutions diffuses, en matières organiques, en nutriments, en substances dangereuses ; restauration du fonctionnement hydromorphologique des milieux, etc.) ou des outils de diagnostic chimique et biologique déjà développés ou en cours de développement – par exemple pour la chimie, indicateurs gradués et agrégés d'évaluation de l'état des eaux, cf. annexe 12.

L'annexe 12 du présent guide fournit quelques **indications à utiliser pour appuyer le diagnostic de l'état des eaux**, en complément des règles de classification de l'état des masses d'eau. Ces diagnostics sont portés, à différentes échelles, suivant des modalités adaptées en fonction des problématiques considérées. Le présent guide ne vise pas l'exhaustivité en la matière, ces finalités pouvant être très diverses.

1.1.3 Favoriser la cohérence globale des évaluations de l'état des eaux

Afin de favoriser la cohérence globale des évaluations de l'état des eaux, les pratiques des différents acteurs de l'acquisition de données sur la qualité des milieux aquatiques dans les bassins doivent être harmonisées. C'est pourquoi il est préconisé de suivre ces règles lorsque l'on cherche à établir une évaluation de l'état des eaux, sur la base de données acquises dans le cadre des programmes de surveillance DCE ou bien de réseaux complémentaires. En effet, ces réseaux complémentaires contribuent à mieux évaluer à une échelle plus fine, l'état des eaux et les effets des mesures en complément de l'effet à l'échelle de la masse d'eau.

1.2 Calendrier

Ce guide décrit les règles d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des cours d'eau et plans d'eau, à appliquer pour l'élaboration des cartographies de l'état des masses d'eau à inclure dans **les états des lieux 2019** puis dans les **schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)** et leurs programmes de mesures (PDM) en vigueur pour le **cycle DCE 2022-2027**.

Ces règles peuvent être amenées à évoluer d'un cycle à l'autre pour tenir compte des travaux menés aux niveaux européen² et national³. Ceux-ci fourniront des résultats supplémentaires permettant d'établir des règles d'évaluation plus abouties scientifiquement et plus complètes au regard des exigences de la DCE.

En cohérence avec les cycles de gestion de six ans (SDAGE et PDM) instaurés par la DCE, la révision des règles d'évaluation s'envisage à chaque cycle, selon le principe général suivant : **un référentiel unique d'évaluation de l'état des eaux par cycle de gestion**.

1.3 Contenu du guide

Le présent guide donne les instructions permettant l'évaluation de l'état écologique (ou du potentiel écologique pour les masses d'eau fortement modifiées (MEFM) ou masses d'eau artificielles (MEA)) et de l'état chimique au niveau d'un site d'évaluation, qui se caractérisent par :

² Notamment l'inter-étalonnage européen des méthodes d'évaluation de l'état écologique des plans d'eau, dont les résultats ont fait l'objet d'une décision de la Commission européenne le 12 février 2018. La liste des substances prioritaires est également mise à jour à chaque cycle, à l'exception du passage au cycle 2022-2027 qui se fera à liste constante.

³ Exploitation des données acquises dans le cadre des programmes de surveillance DCE ; mise au point de méthodes d'évaluation améliorées et complétées, mise à jour des polluants spécifiques de l'état écologique.

- pour l'état écologique ou le potentiel écologique :
 - trois diagnostics distincts (éléments biologiques, paramètres généraux de la physico-chimie, polluants spécifiques de l'état écologique) ;
 - cinq classes pour l'état écologique (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) et quatre classes pour le potentiel écologique (bon et plus, moyen, médiocre, mauvais) ;
- pour l'état chimique :
 - les paramètres à suivre définissant l'état chimique des eaux, aussi appelés substances prioritaires et dangereuses prioritaires ;
 - les normes de qualité environnementales (NQE) pour chacun de ces paramètres ;
 - deux classes d'état (bon, mauvais).

Pour répondre aux exigences européennes de rapportage, le présent guide précise également, outre les **données mobilisables**, les **indicateurs**, les **valeurs-seuils** et les **modes de calcul** pour chaque indicateur :

- les **règles d'agrégation** entre les différents éléments de qualité afin de parvenir à un état écologique agrégé, et entre les différentes substances afin de parvenir à un état chimique agrégé ;
- les modalités de prise en compte de la **variabilité spatiale** et d'**extrapolation spatiale** afin d'attribuer un état écologique et un état chimique à chaque masse d'eau ;
- les modalités d'attribution d'un **niveau de confiance à l'état écologique et à l'état chimique**, évalués pour une masse d'eau ;
- les modalités spécifiques relatives à l'évaluation du **potentiel écologique** sur les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées.

Cas des régions ultrapériphériques :

Les principes généraux fondant l'évaluation de l'état des eaux sont applicables à la France métropolitaine et dans les régions ultrapériphériques (définition du bon état, données mobilisables pour l'évaluation, règles d'agrégation entre éléments de qualité, prise en compte de la variabilité spatiale et règles d'extrapolation spatiale, attribution d'un niveau de confiance, etc.).

Compte tenu des connaissances techniques actuelles et des spécificités de chacun de ces départements, certains indicateurs physico-chimiques généraux, ou certaines valeurs-seuils, n'y sont pas adaptés. Dans l'attente d'indicateurs adaptés à l'écologie de ces milieux, le préfet coordonnateur de bassin évalue l'état écologique des masses d'eau de surface au regard des définitions normatives indiquées en annexe 1 de l'arrêté du 25 janvier 2010, en s'appuyant sur les connaissances actuelles, les indicateurs provisoires et le dire d'expert.

S'agissant des éléments de qualité biologiques, plusieurs indices spécifiques ont été mis au point pour les cours d'eau des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Pour le département de Mayotte, dans l'attente d'indices biologiques adaptés à l'écologie de ces milieux, le préfet coordonnateur de bassin évalue l'état écologique des masses d'eau de surface au regard des définitions normatives indiquées en annexe 1 de l'arrêté du 25 janvier 2010, en s'appuyant sur les connaissances actuelles, des indicateurs provisoires et le dire d'expert.

Pour les plans d'eau des RUP, le faible nombre d'écosystèmes (trois MEFM/MEA et un plan d'eau naturel) et l'absence de référence ne permet pas de développer d'indicateur DCE. Aussi, des grilles de qualité sont à construire par expertise avec l'appui technique de l'AFB.

S'agissant de l'état chimique, les difficultés liées aux coûts d'échantillonnage et d'analyse, à la logistique, aux capacités analytiques des laboratoires locaux et aux conditions hydrologiques spécifiques ont conduit certains RUP à adapter leur programme de surveillance. En particulier, le recours aux échantillonneurs passifs, non autorisés par la directive, constitue une alternative intéressante et encouragée. Dans l'attente d'un cadrage européen sur ces outils, les données recueillies pourront nourrir l'évaluation sur dire d'experts. Par ailleurs, le suivi des substances prioritaires disposant d'une NQE dans le biote n'est pas imposé dans l'attente de la parution des éléments de cadrage sur ce type de suivi en outre-mer, conformément à ce qui est indiqué dans l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010 modifié.

1.4 Remarques concernant les liens entre l'état des masses d'eau et les mesures des programmes de mesures de la DCE

Les résultats obtenus à partir des règles énoncées dans le présent guide font partie des éléments à considérer pour déterminer et suivre les actions des programmes de mesures DCE et des autres dispositifs de planification dans le domaine de l'eau, ainsi que pour l'instruction des projets d'installation, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation environnementale.

Cependant, elles ne traitent pas de la détermination de ces mesures. En effet, la définition des mesures nécessaires au respect des objectifs environnementaux de la DCE est fondée sur une analyse de risque⁴ qui nécessite de considérer d'autres informations que la classe d'état attribuée à la masse d'eau (état des masses d'eau amont/aval, connaissance des pressions, flux, altérations hydromorphologiques, par exemple) à l'échelle du bassin ou du sous bassin versant.

L'annexe 13 au présent guide donne des indications relatives à l'utilisation des résultats d'évaluation de l'état écologique des masses d'eau dans ce cadre.

Elle distingue notamment différentes grandes catégories de situations en matière de liens entre l'état écologique des masses d'eau et les mesures des programmes de mesures.

En particulier, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures au titre de la DCE, même lorsque l'objectif d'une masse d'eau est atteint, notamment :

- pour respecter le principe de non-dégradation de cette masse d'eau ;
- pour atteindre l'objectif ou respecter le principe de non-dégradation d'autres masses d'eau ;
- pour ne pas compromettre l'atteinte des objectifs des zones protégées ;
- ou au titre d'autres réglementations nationales applicables.

⁴ Le guide pour la mise à jour des états des lieux publié par la direction de l'eau et de la biodiversité en août 2017 donne les définitions et méthodes permettant d'évaluer le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux de la DCE. L'une des finalités de cette évaluation du risque est de fonder la construction du programme de mesures destiné à réduire les pressions importantes à l'origine d'un tel risque, pour précisément faire en sorte que, hors demandes d'exemptions dûment justifiées, le risque ne se traduise pas dans les faits par une non atteinte des objectifs à l'échéance considérée.

Par ailleurs, le guide technique DGALN/DGPR du 13 décembre 2012 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l'eau dans les pratiques des services de police en charge des IOTA et des ICPE fournit des éléments de cadrages techniques et juridiques pour instruire, contrôler et fixer des prescriptions complémentaires aux IOTA et ICPE, sur la base d'un diagnostic des pressions et de l'état du milieu, au regard des objectifs fixés par la DCE, et à des échelles d'étude permettant d'apprécier les impacts cumulatifs.

2. RÈGLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE

Le système d'évaluation de l'état des eaux (SEEE) est le système national qui met à disposition les éléments de référence pour le calcul des indicateurs à travers une interface commune d'accès aux algorithmes disponibles à l'adresse suivante : <http://www.see.eaufrance.fr>

L'ensemble des résultats des indicateurs doit être calculé à l'aide du système d'évaluation de l'état des eaux ou d'un système équivalent utilisant les mêmes algorithmes.

Afin d'assurer la stabilité du système d'évaluation au regard de l'évolution de la taxinomie, il a été mis en place une gouvernance de la prise en compte des évolutions taxinomiques pour la surveillance et l'évaluation de l'état (GETSEE). Cette gouvernance permet de prendre en compte l'évolution de la taxinomie afin de limiter l'impact de son évolution sur l'évaluation de l'état des eaux en créant ou en mettant à jour des tables de transcodage et en rédigeant des notes relatives aux règles pratiques pour le calcul d'indicateurs. Dans ce cadre, il a été mis en place un espace collaboratif appelé forge Taxinomie et Bio-indication. Il est le point unique pour les utilisateurs permettant le signalement par les utilisateurs, l'analyse de la pertinence de la demande et la prise en compte des besoins d'évolution de la taxinomie (nouveaux taxons, mise à jour suite à une modification de la systématique) par les indicateurs du SEEE. Cet espace est accessible à l'adresse suivante : <https://forge.eaufrance.fr/projects/gouvernance-taxons>

2.1 Données mobilisables

2.1.1 Origine

Les données de surveillance à mobiliser pour élaborer les cartes d'état des eaux sont celles diffusées par les bassins dans le cadre du système d'information sur l'eau (SIE). Il s'agit donc exclusivement de données validées, en ce sens notamment qu'elles sont acquises dans le respect des normes, des méthodes, des cahiers de charges et, d'une manière générale, de l'ensemble des guides de bonnes pratiques existants.

Ces données, disponibles sur les sites internet des agences de l'eau, incluent les résultats des relevés de terrain relatifs aux différents éléments de qualité, mais aussi d'autres informations, requises afin d'appliquer les méthodes d'évaluation, dont notamment :

- le type FR de la station, requis pour l'évaluation de tous les éléments de qualité biologiques
- l'altitude de la station, requise pour le calcul de l'IPR et l'attribution d'une classe d'état de l'élément de qualité poissons ;
- la taille du bassin versant de la station, requise pour l'attribution d'une classe d'état de l'élément de qualité diatomées ;
- le domaine piscicole de la station, requis pour l'évaluation de l'élément de qualité physico-chimique température en cours d'eau ;
- l'appartenance ou non de la station à une exception typologique, pour l'évaluation des éléments de qualité physico-chimiques généraux des cours d'eau ;
- le fond géochimique en polluants spécifiques de l'état écologique non synthétiques, et certains paramètres liés à la qualité de l'eau affectant la biodisponibilité de ces polluants. De telles données peuvent être utilisées afin de corriger les normes de qualité environnementale applicables pour ces polluants non synthétiques.

Pour pouvoir attribuer un état écologique à chacune des masses d'eau, il s'avère indispensable de s'appuyer sur l'ensemble des informations adéquates disponibles. C'est pourquoi, on utilisera les données de surveillance de l'état des milieux acquises non seulement à partir **des réseaux établis en application de la DCE** (réseau de contrôle de surveillance, réseau de contrôle opérationnel, réseau de référence), mais également celles issues d'autres réseaux. Parmi ces données, on exclura toutefois celles qui ne correspondent pas au cahier des charges suivant :

- les **sites de suivi** sont **représentatifs** de l'état d'une masse d'eau ;
- les **protocoles de prélèvement et d'analyse** sont **conformes** à ceux prescrits dans le cadre des réseaux DCE⁵.

L'annexe 9 précise les critères permettant d'identifier les sites représentatifs de l'état d'une masse d'eau, tels qu'ils sont définis par l'arrêté évaluation dans la section 1 de son annexe 9.

2.1.2 Chroniques

Afin d'accroître la fiabilité de l'évaluation obtenue sur un même site de suivi pour chaque élément de qualité ou paramètre de **l'état écologique (hors polluants spécifiques)**, il est nécessaire d'avoir recours à un nombre suffisant de données. Ainsi, dans l'objectif de procéder à une évaluation actualisée de l'état des masses d'eau, tout en tenant compte de la variabilité naturelle des milieux et de la disponibilité des données, il sera utilisé :

les données de surveillance des **trois dernières années⁶ pour les cours d'eau** (par exemple les années 2015, 2016 et 2017 seront utilisées pour les cartes des états des lieux 2019) ;

les données de surveillance des **six dernières années⁷ pour les plans d'eau** (par exemple les années 2012 à 2017 seront utilisées pour les cartes des états des lieux 2019).

Les chroniques de données plus longues éventuellement disponibles doivent être utilisées, suivant les cas, pour l'évaluation de l'état d'une masse d'eau (cf. paragraphe 2.3.3 relatif aux situations de lacunes de données et annexe 9) ou pour l'attribution d'un niveau de confiance à l'état évalué d'une masse d'eau (cf. paragraphe 2.5 et annexe 10).

Pour les **polluants spécifiques de l'état écologique**, on utilisera les résultats des données validées de l'année de suivi la plus récente.

2.2 Évaluation par élément de qualité (indicateurs, valeurs-seuils, modalités de calcul (intégration temporelle par indicateur))

Conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, les données de surveillance sont acquises à partir de protocoles normalisés ou standardisés (cf. 2.1). Les données obtenues à l'aide de ces méthodes de prélèvement sont utilisées pour évaluer l'état des eaux.

⁵ Ces protocoles sont mentionnés notamment dans l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux, modifié par l'arrêté du 29 juillet 2011 puis par l'arrêté du 7 août 2015 et enfin par l'arrêté du 27 juillet 2018, et diffusés dans le cadre de la mise en œuvre des réseaux DCE. Ils sont conçus pour que les données, notamment biologiques, ainsi acquises rendent compte de l'effet global sur l'état de la masse d'eau des éventuelles pressions que celle-ci subit.

⁶ Une chronique de trois années est nécessaire pour évaluer de manière relativement fiable l'état d'une masse d'eau.

⁷ Pour les plans d'eau, vu l'inertie des milieux et la faible disponibilité des données, le recours à une chronique plus longue que pour les cours d'eau s'impose. Par ailleurs et de manière générale, il convient de relativiser la notion d'état actualisé des masses d'eau, puisque la variabilité naturelle des milieux et le délai de réponse des éléments ne permettent pas de rendre compte immédiatement des changements.

Conformément à la DCE, ces données sont utilisées par des indicateurs pour évaluer l'état à l'élément de qualité. Pour rappel, ces indicateurs sont disponibles dans des algorithmes de référence qu'utilise le SEEE : <http://www.seee.eaufrance.fr> (cf. 2.). Les résultats permettent l'affectation de la classe d'état à l'élément de qualité.

Ces derniers doivent être arrondis à deux décimales inférieures à celle permettant la détermination de la classe avant d'être moyennés.

Exemple, pour l'indice biologique diatomées (IBD), le résultat d'EQR 0,7853216 peut être arrondi à 0,7853 sachant que la limite entre les classes bon et moyen est 0,78. Dans le cas présent la classe d'état est bonne avant d'être moyennée.

2.2.1 Éléments de qualité cours d'eau

2.2.1.1 Éléments biologiques

Pour les cours d'eau, **les éléments de qualité biologique** à prendre en compte pour l'évaluation de l'état écologique sont :

- **la flore aquatique** ;
- **la faune benthique invertébrée** ;
- **l'ichtyofaune**.

Dans le cadre de la DCE, l'élément de qualité biologique flore aquatique comprend les macrophytes, le phytobenthos (diatomées) et le phytoplancton pour les très grands cours d'eau. Dans le cadre des règles d'évaluation nationale de l'état écologique des eaux, macrophytes et phytobenthos sont considérés comme deux éléments de qualité biologique distincts.

Dans le texte de la DCE, le phytoplancton n'est pas explicitement inclus à l'annexe V, 1.1.1 dans la liste des éléments de qualité pour les rivières. En revanche il est inclus comme élément de qualité biologique à l'annexe V, 1.2.1. À cet égard, l'élément de qualité phytoplancton peut être utilisé comme un élément de qualité biologique à part entière lorsqu'il est pertinent, en particulier pour évaluer l'état des très grands cours d'eau.

Selon la DCE, l'état écologique correspond à la **qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques**. Sa déclinaison en cinq classes s'établit sur la base d'un écart aux conditions de référence⁸ par type de masses d'eau. Les éléments biologiques jouant un rôle essentiel dans l'évaluation de l'état écologique, un exercice européen d'inter-étalonnage des limites du bon état est mis en œuvre dans le cadre de la DCE⁹ validant au fur et à mesure de leur mise à disposition les limites des classes très bon/bon et bon/moyen des indicateurs biologiques métropolitains. Pour les indicateurs développés après cet exercice, ils font l'objet d'un exercice de raccordement à l'inter-étalonnage. Les résultats de cet exercice sont publiés dans une décision de la Commission européenne et s'impose aux États membres. La décision la plus récente est la décision de la Commission n°2018/229/UE du 12 février 2018 reprenant l'ensemble des indicateurs validés à l'heure actuelle par la Commission européenne. Dans la continuité des instructions diffusées jusqu'à présent et comme défini par l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010, **les indices biologiques, valeurs-seuils et règles de calcul** à appliquer pour évaluer l'état des **éléments de qualité biologique** des cours d'eau sont présentés ci-après.

⁸ Situations peu ou pas perturbées

I-Indices et valeurs-seuils

■ Invertébrés

Pour la métropole : **l'indice invertébrés multimétrique (I₂M₂ – code Sandre 7613)**

De manière temporaire pour le prochain cycle, il est possible en lieu et place de l'I₂M₂ pour l'HER 9A d'utiliser l'indice dit « équivalent » (phases A+B) de la méthode macro-invertébrés NF T90-333 (code Sandre 5910).

Pour les cours d'eau profonds, l'indice biologique invertébrés à utiliser est **l'indice macro-invertébrés grands cours d'eau (MGCE 12 prélèvements – code Sandre 6951)**. Cet indice est calculé au moyen des règles de calcul de la méthode IBGN (NF T90-350 – mars 2004) sur l'ensemble des phases comprenant les 12 prélèvements élémentaires du protocole expérimental d'échantillonnage des macro-invertébrés en cours d'eau profonds de P. Usseglio Polatera, J.G. Wasson et V. Archambault, déc. 2009 puis la norme XP T90-334 dès sa publication.

Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans les tables de **l'annexe 1**¹⁰.

Pour les départements de la Martinique et de la Guadeloupe : **indice biologique macro-invertébrés Antilles (IBMA – code Sandre 8040)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 2**.

Pour le département de la Guyane : **score moyen des éphéméroptères de Guyane (SMEG)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 3**.

Pour le département de la Réunion : **indice Réunion macro-invertébrés (IRM)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 4**.

Pour le département de Mayotte : pas d'indice biologique actuellement disponible.

■ Diatomées

Pour la métropole : **indice biologique diatomées (IBD, code Sandre 5856)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 1**.

Pour les départements de la Martinique et de la Guadeloupe : **indice diatomique antillais (IDA – code Sandre 8053)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 2**.

Pour le département de la Guyane : **indice de polluo-sensibilité spécifique (IPS – code Sandre 1022)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 3**.

Pour le département de la Réunion : **indice diatomique Réunion (IDR – code Sandre 8062)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 4**.

Pour le département de Mayotte : pas d'indice biologique actuellement disponible.

⁹ L'inter-étalonnage a pour but de s'assurer que les limites du bon état écologique établies par élément biologique sont comparables d'un État-membre à un autre et conformes aux définitions normatives de la DCE (annexe V).

¹⁰ Ces valeurs seuils sont applicables quel que soit le protocole de prélèvement IBGN utilisé (norme IBGN NF T90-350, protocole adapté pour le réseau de référence ou protocole adapté pour le programme de surveillance).

■ Macrophytes

Pour la métropole : **indice biologique macrophytique en rivière (IBMR – code Sandre 2928)**. Les limites de classe à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 1**.

Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion : aucun indice biologique macrophytes n'a été développé compte-tenu que cet élément de qualité biologique n'est pas pertinent dans ces départements. Les caractéristiques régissant le fonctionnement et la typologie des cours d'eau des RUP limitent fortement la faisabilité de mise au point d'un indicateur de qualité biologique tels que ceux qui ont été développés en métropole à partir des peuplements macrophytiques (voir argumentation en **annexes 2, 3 et 4**).

■ Poissons

Pour la métropole : **indice poissons rivière (IPR – code Sandre 7036)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 1**.

Pour le département de la Guyane : **indice poissons Guyane global (IPG global)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 3**.

Pour le département de la Réunion : **indice Réunion poissons (IRP)**. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 4**.

Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de Mayotte : pas d'indice biologique actuellement disponible.

II-Modalités de calcul

Pour chaque élément biologique, on calculera la **moyenne** des indices mentionnés précédemment, obtenus à partir des données acquises lors des trois dernières années pour les cours d'eau et des six dernières années pour les plans d'eau, par exemple **2015, 2016 et 2017** pour les cartes des cours d'eau des états des lieux 2019¹¹.

Exemple : pour un cours d'eau dont la note d'EQR de l'IBD est de 0,6852 en 2015, de 0,7013 en 2016 et de 0,7543 en 2017 la valeur de l'IBD à prendre en compte (cf. 2.1.2) sera de 0,7136. Cette valeur permettra de déterminer la qualité du cours d'eau pour l'élément de qualité biologique diatomées. Il sera à agréger avec les classes des autres éléments de qualité biologique et physico-chimique selon le principe du paramètre le plus déclassant (principe du one out/all out) pour déterminer l'état écologique du cours d'eau.

Pour les invertébrés et les diatomées, le calcul s'effectue en général sur les données issues de trois opérations de contrôle, d'une ou deux pour les poissons et les macrophytes.

En pratique, lorsque l'on dispose d'une unique opération de contrôle, le calcul peut être utilisé mais le résultat doit être confirmé à dire d'expert.

Remarque : la robustesse des données utilisées pour l'évaluation d'un élément de qualité est prise en compte lors de l'attribution du niveau de confiance de l'état écologique attribué à une masse d'eau, selon les modalités définies à l'annexe 10.

¹¹ Dans les cas où l'on dispose de plusieurs mesures pour une même année, notamment pour les invertébrés, on utilisera la valeur de l'indice mesuré lors de la période la plus comparable à celle préconisée par l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010.

2.2.1.2. Éléments physico-chimiques généraux

Pour les cours d'eau, **les cinq éléments de qualité physico-chimique généraux** à prendre en compte pour l'évaluation de l'état écologique sont :

- **la température ;**
- **le bilan d'oxygène ;**
- **la salinité ;**
- **l'état d'acidification ;**
- **la concentration en nutriments.**

Certains de ces éléments de qualité physico-chimique généraux sont composés de plusieurs paramètres physico-chimiques tel qu'indiqué en annexe 5.

Exemple : pour les rivières, l'élément de qualité bilan de l'oxygène comprend les paramètres oxygène dissous, taux de saturation en O_2 dissous, DBO_5 , carbone organique dissous.

I-Paramètres et valeurs-seuils

Selon la DCE, **les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs des conditions biologiques**¹². Pour la classe d'état bon et les classes inférieures¹³, les valeurs-seuils de ces éléments physico-chimiques doivent être fixées de manière à respecter les conditions permettant aux éléments de qualité biologique d'atteindre ces mêmes classes d'état. En outre, pour la classe bon, elles doivent être fixées de manière à permettre le bon fonctionnement de l'écosystème.

Les paramètres¹⁴ **et valeurs-seuils** à prendre en compte sont ceux mentionnés en **annexe 5**. Le cas échéant, les valeurs-seuils adaptées pour certains types de cours d'eau sont à utiliser (cf. annexe 5).

II-Modalités de calcul

Pour le calcul de l'état physico-chimique, on utilisera les données acquises lors des trois dernières années, par exemple 2015, 2016 et 2017 pour les cartes des états des lieux 2019.

Pour les **paramètres oxygène dissous et taux de saturation en O_2 dissous**, on calculera le **percentile 10** à partir des données acquises lors de ces trois années.

Pour **l'élément de qualité acidification**, on comparera :

- le percentile 10 obtenu des données acquises lors de ces trois années aux valeurs du pH_{\min} ;
- le percentile 90 obtenu des données acquises lors de ces trois années aux valeurs du pH_{\max} .

La classe d'état de l'élément de qualité acidification est déterminée par la classe d'état la moins bonne de ces deux paramètres (pH_{\min} ou pH_{\max}).

Pour les **autres éléments de qualité**, on calculera le **percentile 90**, pour chaque paramètre, à partir des données acquises lors de ces trois années¹⁵.

¹² Les éléments physico-chimiques généraux ne sont pas les seuls facteurs d'influence des éléments biologiques.

¹³ Classes moyen, médiocre et mauvais.

¹⁴ En l'état actuel des connaissances, les limites de classes sont exprimées par paramètre et non par élément de qualité (par exemple l'oxygène dissous est un paramètre de l'élément bilan d'oxygène).

III-Volume de données à utiliser

Le calcul s'effectue de préférence sur les données issues d'au moins dix opérations de contrôle. En pratique, il peut être conduit avec un nombre d'opérations inférieur mais le résultat obtenu est à confirmer à dire d'expert.

En deçà d'un nombre de quatre opérations de contrôle, le résultat est indéterminé.

2.2.1.3 Polluants spécifiques de l'état écologique

I-Liste des polluants spécifiques de l'état écologique et normes de qualité environnementales de l'état écologique

Les polluants spécifiques de l'état écologique (PSEE) sont définis par la DCE comme des substances déversées en quantités significatives dans un bassin ou un sous bassin hydrographique.

Les listes de PSEE répondent aux deux interprétations complémentaires de cette définition. Ont été retenus comme PSEE :

- d'une part les substances rejetées en quantités telles que des déclassements sont observés dans le milieu sur la base des éléments d'évaluation disponibles ;
- d'autre part les substances rejetées en fort tonnage dans le milieu.

Les substances choisies comme PSEE répondent également aux critères suivants :

- avoir une norme robuste associée ;
- ne pas être interdites, ni ubiquistes ;
- avoir été suffisamment recherchées lors du premier cycle (au moins 10 % des stations du bassin) ;
- ne pas présenter de problèmes analytiques majeurs à l'heure actuelle, afin de ne pas nuire à l'évaluation de l'état lors du second cycle.

Les polluants spécifiques de l'état écologique, leurs normes de qualité environnementales (NQE) et les définitions des classes d'état pour cet élément sont présentés en **annexe 6**. Ces informations sont également consultables dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié (annexe 3, tableaux 43 et 44).

II-Modalités de calcul

Les NQE pour les substances de l'état écologique sont exprimées en moyenne annuelle.

La vérification du respect ou non des NQE par substance s'effectuera à partir des données mesurées suivant le même modèle que pour les substances de l'état chimique (cf. règles de l'état chimique au paragraphe 3).

¹⁵ Le calcul du percentile 90 de chaque paramètre s'effectue selon la formule du SEQ eau V1 sur la base des données acquises sur l'ensemble de la période des trois années.

III-Volume de données à utiliser

Le calcul s'effectue sur les données issues au minimum de quatre opérations de contrôle, conformément aux fréquences prescrites par l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié. On retient la moyenne annuelle de l'année la plus récente disponible.

En deçà d'un nombre de quatre opérations de contrôle, le résultat est indéterminé.

2.2.1.4 Synthèse des éléments de qualité et indicateurs à prendre en compte pour l'évaluation de l'état écologique des cours d'eau

Voir tableau page suivante

		Indicateurs disponibles à utiliser pour l'évaluation				
		Métropole Cours d'eau / Grand cours d'eau	Antilles	Guyane	Réunion	Mayotte
Éléments de qualité biologique	Paramètres biologiques					
Phytoplancton	Composition, abondance et biomasse					
Macrophytes	Composition et abondance	IBMR /IBMR				
Phytobenthos	Composition et abondance	IBD / IBD	IDA	IPS	IDR	
Faune benthique invertébrée	Composition et abondance	I2M2* / MGCE	IBMA	SMEG	IRM	
Ichtyofaune	Composition, abondance et structure de l'âge	IPR		IPG global	IRP	
Éléments de qualité physico-chimique	Paramètres physico-chimiques					
Température de l'eau	-	Valeurs-seuils en annexe 5	Valeurs-seuils en annexe 5 adaptables aux spécificités locales			
Bilan d'Oxygène	Oxygène dissous	Valeurs-seuils en annexe 5	Valeurs-seuils en annexe 5 adaptables aux spécificités locales			
	Taux de saturation en O ₂					
	DBO5					
	Carbone organique dissous					
Salinité	Conductivité					
	Chlorures					
	Sulfates					
État d'acidification	pH _{min} et pH _{max}	Valeurs-seuils en annexe 5	Valeurs-seuils en annexe 5 adaptables aux spécificités locales			
Concentration en nutriment	PO ₄ ³⁻	Valeurs-seuils en annexe 5	Valeurs-seuils en annexe 5 adaptables aux spécificités locales			
	Phosphore total					
	NH ₄ ⁺					
	NO ₂ ⁻					
	NO ₃ ⁻					

		Indicateurs disponibles à utiliser pour l'évaluation				
		Métropole Cours d'eau / Grand cours d'eau	Antilles	Guyane	Réunion	Mayotte
Polluants spécifiques de l'état écologique		Liste et valeurs seuils en annexe 6				
Éléments de qualité hydro-morphologique	Paramètres hydro-morphologiques					
Régime hydrologique	Quantité et dynamique du débit d'eau					
	Connexion aux masses d'eau souterraines					
Continuité de la rivière	-					
Conditions morphologiques	Variation de la profondeur et de la largeur de la rivière					
	Structure et substrat du lit					
	Structure de la rive					

 En rouge : indicateurs non disponibles

 En vert : indicateurs disponibles

 En gris : éléments de qualité non pertinents

* dispositif transitoire sur l'HER 9A permettant l'utilisation temporaire de l'IBGN sur ce territoire.

2.2.2 Éléments de qualité plans d'eau

Pour l'évaluation de l'état écologique des plans d'eau, les indices biologiques, valeurs-seuils et règles de calcul à appliquer sont les suivants.

2.2.2.1 Éléments biologiques

Pour la métropole :

I-Indices et valeurs-seuils

Phytoplancton : **indice phytoplancton lacustre (IPLAC – code Sandre 1017)**. Cet indice s'applique aux lacs naturels et aux plans d'eau artificiels de la métropole. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 7**.

Invertébrés : aucun indice biologique n'est actuellement disponible pour la faune benthique invertébrée des plans d'eau. Une campagne exceptionnelle de prélèvement lancée en 2018 devrait permettre de développer un indice adapté aux diverses typologies de plans d'eau.

Diatomées : aucun indice biologique n'est actuellement disponible pour le phytobenthos des plans d'eau. Une campagne exceptionnelle de prélèvement se déroulant de 2016 à 2018 devrait permettre de développer un indice adapté aux plans d'eau.

Macrophytes : **indice biologique macrophytique en lac (IBML – code Sandre 7982)**. Cet indice s'applique aux plans d'eau naturels et d'origine anthropique de la typologie nationale. Toutefois, bien que techniquement applicable aux plans d'eau d'origine anthropique, l'IBML n'est pas utilisé pour évaluer le potentiel écologique des MEFM/MEA conformément aux dispositions de l'arrêté évaluation (voir chapitre 2.6 et 2.7 ci-après). Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 7**.

Poissons : **indice ichtyofaune lacustre (IIL – code Sandre 1018)**. Cet indice s'applique aux seuls plans d'eau naturels de métropole de la typologie nationale des plans d'eau. Il ne s'applique pas aux plans d'eau d'origine anthropique de la typologie nationale ni aux RUP. Les limites de classes à prendre en compte sont celles mentionnées dans la table de **l'annexe 7**.

En complément, **l'indice ichtyofaune retenue (IIR)** peut être utilisé de façon optionnelle pour affiner le diagnostic des MEFM/MEA.

II-Modalités de calcul

Pour chaque paramètre, on calculera la **moyenne** des indices obtenus à partir des données acquises lors des six dernières années, par exemple de **2012 à 2017** pour les cartes à inclure dans les états des lieux 2019.

Pour les RUP :

Aucun indice biologique n'est disponible. L'évaluation se fera donc par expertise avec l'appui technique de l'AFB. Dans cette perspective, la pertinence des différents EQB est à établir ou à confirmer. Des stratégies de suivi sont à mettre en place par EQB (périodes, fréquences, paramètres, etc.) et des acquisitions de données sont à réaliser au cours du 3^e cycle DCE en continuité du 2^e cycle.

Seule l'île de la Réunion est concernée par un plan d'eau considéré comme une masse d'eau naturelle (Le grand Étang – plan d'eau endoréique).

2.2.2.2 Éléments physico-chimiques généraux

I-Paramètres et valeurs-seuils

Les **paramètres¹⁶ et valeurs-seuils** à prendre en compte sont ceux mentionnés en annexe 3 de l'arrêté évaluation, rappelés en **annexe 8** du présent guide. Les valeurs-seuils à prendre en compte ont été mises à jour par l'arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l'environnement.

Les éléments de qualité concentration en nutriments et transparence interviennent en soutien à la biologie. L'élément de qualité concentration en nutriments est composé des paramètres phosphore total, nitrates et ammonium.

¹⁶ Comme pour les cours d'eau, en l'état actuel des connaissances, les limites de classes sont exprimées par paramètre et non par élément de qualité.

L'élément de qualité transparence repose sur un seul paramètre : la profondeur minimale (en cm) à partir du miroir de l'eau pour laquelle le disque de Secchi (disque blanc de 20 cm de diamètre) cesse d'être visible.

Les limites de classes pour les paramètres constitutifs des éléments de qualité concentration en nutriments et transparence varient en fonction de la profondeur moyenne des plans d'eau.

Pour le **paramètre phosphore total**, les valeurs-seuils limites de classes d'état prennent en compte une marge de sécurité :

- qui tient compte des incertitudes de prédiction des modèles statistiques entre les paramètres physico-chimiques et l'IPLAC ;
- qui décline les plans d'eau sur la base de la physico-chimie seulement si la probabilité que le phosphore soit à l'origine du déclassement de l'IPLAC est d'au moins 66 %.

Il en résulte que les valeurs-seuils du paramètre phosphore total sont mécaniquement plus tolérantes que celles de l'IPLAC.

En outre, le fait de prendre en compte la valeur médiane peut conduire, selon les mesures disponibles, à des valeurs faibles et non déclassantes en décalage avec l'état donné par l'IPLAC. Ainsi, lorsque l'indice IPLAC est déclassant, sans que le paramètre phosphore ne soit déclassant, alors une expertise sur la distribution des valeurs est à réaliser et la limite de classe d'état calculée pour le phosphore pourra être considérée comme indicative.

Il convient de noter que les orthophosphates n'ont pas été retenus parmi les nutriments pertinents pour l'évaluation. En effet, selon les épisodes plus ou moins rapides de croissance des végétaux, les phosphates peuvent arriver abondamment dans un plan d'eau du fait des activités anthropiques, sans pour autant que leur concentration à un instant donné soit élevée s'ils sont mesurés après un événement de croissance. La fréquence relativement faible de suivi des conditions physico-chimiques dans les réseaux (i.e. quatre campagnes annuelles, une ou deux année(s) par plan de gestion) vis-à-vis de la vitesse de consommation des orthophosphates ne permet pas d'avoir une image globale objective de la quantité de phosphates bio-disponible dans les plans d'eau, et donc, de leur niveau d'eutrophisation.

Pour le **paramètre nitrates**, les valeurs-seuils de limites de classes de l'état dépendent à la fois du temps de résidence des plans d'eau et de leur profondeur moyenne.

Le temps de résidence est estimé en divisant le volume connu du plan d'eau par le débit connu en sortie ou estimé par la surface du bassin versant.

Pour les plans d'eau dont le temps de résidence est inférieur ou égal à 30 jours, les valeurs-seuils limites de classes à prendre en compte sont celles applicables aux cours d'eau afin de ne pas introduire de distorsion entre l'évaluation de leur état et l'évaluation de l'état des cours d'eau les alimentant.

Pour les plans d'eau dont le temps de résidence est supérieur à 30 jours, les valeurs-seuils limites de classes pour les nitrates sont celles figurant en annexe 8 du présent document soit pour le seuil bon/moyen une valeur maximale de :

- 5,3 mg/l pour les plans d'eau d'une profondeur moyenne inférieure ou égale à 15 m ;
- 2,6 mg/l pour les plans d'eau d'une profondeur moyenne supérieure à 15 m.

Toutefois, cette valeur pour le seuil bon-moyen peut être portée à 13 mg/l (quelle que soit la profondeur du plan d'eau) lorsque les pressions anthropiques affectant la concentration en nitrates du plan d'eau sont nulles ou faibles sur le bassin versant et lorsque les indicateurs biologiques témoignent de façon robuste d'un état bon ou très bon. Pour considérer que les indicateurs biologiques témoignent de façon robuste d'un état bon ou très bon, les conditions ci-après doivent être réunies :

- tous les éléments de qualité biologique pertinents sont évalués (y compris l'IBML pour les MEFM/MEA pour les typologies pertinentes lorsque le marnage est inférieur à 2 m) ;
- disposer d'au moins deux années de suivi pour le phytoplancton et la physico-chimie lors des six années consécutives les plus récentes prises en compte ;
- les deux calculs de l'IPLAC sur cette période (sans faire la moyenne) donnent un état bon ou très bon.

La valeur seuil état bon/moyen pour le **paramètre bilan d'oxygène** est donnée à titre indicatif.

Pour les **paramètres température de l'eau, salinité et état d'acidification**, aucune valeur n'a pu être établie à ce stade des connaissances.

II-Modalités de calcul

L'état de chaque paramètre est évalué selon les modalités décrites en annexe 8, à partir des données acquises lors des six dernières années, par exemple de **2012 à 2017** pour les cartes des états des lieux 2019.

Pour les paramètres phosphore total et profondeur du disque de Secchi, les évaluations par plan de gestion sont faites sur la base des valeurs médianes de l'ensemble du jeu de données, ceci pour limiter le poids d'évaluations annuelles exceptionnelles et non représentatives de l'état moyen sur le plan de gestion (e.g. conditions hydro-climatiques pour les plans d'eau à court temps de séjour).

Pour les paramètres ammonium et nitrates, les évaluations par plan de gestion sont faites sur la base des valeurs maximales de l'ensemble du jeu de données. Les concentrations maximales ont été choisies en raison de la plus grande significativité de la réponse aux métriques de l'IPLAC pour l'ammonium et de la plus grande significativité de la réponse à l'occupation du sol de type agriculture pour les nitrates. De plus, pour les nitrates, la concentration maximale est représentative de la capacité productive des lacs.

2.2.2.3 Polluants spécifiques de l'état écologique

Les principes définis pour les cours d'eau sont applicables aux plans d'eau (voir **annexe 6** pour la liste des substances et NQE).


2.2.2.4 Synthèse des éléments de qualité et indicateurs à prendre en compte pour l'évaluation de l'état écologique des plans d'eau

		Indicateurs* disponibles à utiliser pour l'évaluation		
		Métropole - plans d'eau naturels	Métropole - plans d'eau d'origine anthropique	RUP
Éléments de qualité biologique	Paramètres biologiques			
Phytoplancton	Composition, abondance et biomasse	IPLAC	IPLAC	
Macrophytes	Composition et abondance	IBML	IBML**	
Phytobenthos	Composition et abondance			
Faune benthique invertébrée	Composition et abondance			
Ichtyofaune	Composition, abondance et structure de l'âge	IIL	IIR***	Guyane = non disponible
Éléments de qualité physico-chimique	Paramètres physico-chimiques			
Transparence	Profondeur du disque de Secchi	Valeurs-seuils en annexe 8	Valeur seuils en annexe 8	Valeurs-seuils en annexe 8 à adapter aux spécificités locales avec l'appui technique de l'AFB
Température de l'eau	-			
Bilan d'oxygène	Désoxygénation de l'hypolimnion	Valeurs-seuils en annexe 8	Valeurs-seuils en annexe 8	Valeurs-seuils en annexe 8 à adapter aux spécificités locales avec l'appui technique de l'AFB
Salinité	Conductivité			
	Chlorures			
	Sulfates			
État d'acidification	pH _{min} et pH _{max}			
Concentration en nutriment	Phosphore total	Valeurs-seuils en annexe 8	Valeurs-seuils en annexe 8	Valeurs-seuils en annexe 8 à adapter aux spécificités locales avec l'appui technique de l'AFB
	NH ₄ ⁺			
	NO ₃ ⁻			
Polluants spécifiques de l'état écologique		Liste et valeurs seuils en annexe 6		

		Indicateurs* disponibles à utiliser pour l'évaluation		
		Métropole - plans d'eau naturels	Métropole - plans d'eau d'origine anthropique	RUP
Éléments de qualité hydromorphologique	Paramètres hydromorphologiques			
Régime hydrologique	Quantité et dynamique du débit d'eau			
	Connexion aux masses d'eau souterraines			
	Temps de résidence			
Conditions morphologiques	Variation de la profondeur du lac			
	Quantité, structure et substrat du lit			
	Structure de la rive			

 En rouge : indicateurs non disponibles

 En vert : indicateurs disponibles

 En jaune : pas d'indicateur validé – un indice est toutefois disponible si besoin afin d'aiguiller le diagnostic

 En gris : éléments de qualité non pertinents

* Les différents indices sont à utiliser dans les limites d'application de leur méthode (se reporter à l'annexe 7 ci-après, au rapport technique intitulé : indices de bioindication pour les plans d'eau (IPLAC, IBML et IIL) : grilles de valeurs-seuils et valeur de référence par site pour les plans d'eau nationaux ainsi qu'au tableau 10 de l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010.

** L'Indice IBML est applicable aux plans d'eau d'origine anthropique indiqués dans le tableau 10 de l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010 et dont le marnage est inférieur à 2 mètres. En revanche, l'IBML n'est pas prescrit pour l'évaluation des MEFM/MEA par l'arrêté de l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010. A ce stade, l'IBML est à utiliser pour affiner le diagnostic pour les MEFM/MEA.

*** L'indice ichtyofaune pour les retenues (IIR) ne fait pas partie des indicateurs DCE mentionnés dans l'arrêté évaluation, mais peut être utilisé à titre complémentaire pour affiner le diagnostic des MEFM/MEA (retenues A2 à A12 de la typologie nationale).

2.2.3 Cas des exceptions typologiques et des exceptions locales

Exceptions typologiques :

Certains éléments ou paramètres (de nature biologique, physico-chimique...) ne sont pas pertinents pour évaluer l'état de certains types de masses d'eau. Dans ce cas, ces éléments ou paramètres ne font pas l'objet de collecte de données et ne sont pas considérés pour l'évaluation de l'état des sites et masses d'eau concernés. C'est le cas par exemple des macrophytes pour l'HER 2. Les cas concernés sont explicités en annexe 1 (pertinence des éléments de qualité de l'état écologique des eaux de surface) de l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010.

Par ailleurs, certains éléments ou paramètres physico-chimiques sont à adapter aux cas de certains types de milieux particuliers. Ces **exceptions typologiques**, qui peuvent concerner de manière assez générale une hydro-écorégion ou un groupe de masses d'eau donné (par exemple exception typologique de la température sur l'HER 6 : Méditerranée), sont toutes explicitées dans le présent guide (cf. annexes 1 à 8). Elles peuvent conduire à ne pas considérer l'élément ou paramètre physico-chimique correspondant, ou à en ajuster les valeurs-seuils, pour l'évaluation de l'état des types de masses d'eau concernées¹⁷. Dans ces cas particuliers, le fait que la valeur de ces éléments ou paramètres soit naturellement influencée sans cause anthropique significative devra pouvoir être justifié.

Exceptions locales :

Certains éléments ou paramètres, ou certaines valeurs-seuils, peuvent s'avérer non pertinents localement, sur certains sites ou certaines masses d'eau, car les valeurs de ces éléments ou paramètres sont naturellement influencés localement sans cause anthropique. Dans ce cas, on pourra ne pas considérer cet élément ou paramètre pour l'évaluation de cette ou de ces masse(s) d'eau ou en ajuster les valeurs-seuils. Ces **exceptions locales** devront être dûment justifiées par un **argumentaire scientifique et technique** montrant la cause naturelle et l'absence d'influence anthropique sur cet élément ou paramètre. Contrairement aux exceptions typologiques, les exceptions locales ne peuvent quant à elles concerner qu'un nombre marginal de masses d'eau ou de stations sur un type donné.

La liste complète des cas relevant de ces exceptions locales, les justifications techniques correspondantes, ainsi que leur actualisation éventuelle, sont **établies et validées par le secrétariat technique de bassin (STB)** et transmises à la DEB pour information. Ces éléments doivent également renseigner les **référentiels SANDRE** concernés (référentiel des stations/points de prélèvement et référentiels des sites d'évaluation).

Ces exceptions sont applicables à l'échelle de la masse d'eau et à celle de la station.

Pour un gestionnaire local, il conviendra donc de se référer à la liste des exceptions validée par le STB pour la carte de l'état des masses d'eau la plus récente publiée dans un document de planification adopté par le comité de bassin (état des lieux ou SDAGE).

¹⁷ À noter que les valeurs-seuils des indices biologiques sont quant à elles adaptées pour les différents types de cours d'eau. Ainsi, par exemple, l'exception typologique de la température pour les cours d'eau de l'HER 6 - Méditerranée (explicitée en annexe 5 du présent guide) signifie que les valeurs-seuils de température ne sont pas appropriées sur ces types de cours d'eau et ne sont donc pas prises en compte pour l'évaluation de leur état. Les valeurs-seuils des indices biologiques sont quant à elles adaptées à ces types de masse d'eau et sont à prendre en compte comme précisé dans les annexes 1, 2 et 3 du présent guide.

2.2.4 Situation de lacunes dans les outils d'interprétation

Il s'agit des cas où l'on ne dispose pas des valeurs-seuils d'un élément de qualité pour interpréter les données disponibles. Dans ce cas, ces données sont utilisées pour appuyer l'expertise et, le cas échéant, évaluer l'état de cet élément de qualité au regard des définitions normatives du bon état données par la DCE et l'arrêté évaluation (annexe I).


2.3. Règles d'agrégation des éléments de qualité

2.3.1 Principes généraux et rôle des différents éléments de qualité dans la classification de l'état écologique

Selon les termes de la DCE, lorsque les valeurs-seuils des différents éléments sont établies conformément aux prescriptions de la DCE, la règle d'agrégation qui s'impose est celle du **principe de l'élément déclassant, au niveau de l'élément de qualité**.

Le rôle des différents éléments de qualité (biologiques, physico-chimiques¹⁸ et hydromorphologiques) dans la classification de l'état écologique est différent pour la classification en état écologique très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.

Le **schéma** suivant¹⁹ indique les **rôles respectifs des éléments de qualité** biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques **dans la classification de l'état écologique**, conformément aux termes de la DCE (définitions normatives de l'annexe V.1.2).



¹⁸ Les éléments de qualité physico-chimiques incluent à la fois les éléments physico-chimiques généraux et les polluants spécifiques de l'état écologique.

¹⁹ Ce schéma est inspiré du document guide « approche générale de la classification de l'état écologique et du potentiel écologique, ECOSTAT, nov. 2003 ».

* L'état physico-chimique est très bon si :

- les paramètres physico-chimiques généraux respectent le très bon état ;
- pour les polluants spécifiques non synthétiques : la concentration est inférieure aux limites de quantification indiquées dans la version en vigueur de l'avis relatif aux limites de quantification des couples paramètre-matrice de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques²⁰ ;
- pour les polluants spécifiques synthétiques : la concentration correspond à une mesure non quantifiée et la limite de quantification respecte la version en vigueur de l'avis relatif aux limites de quantification des couples paramètre-matrice de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
- Correspondre aux conditions de référence pour un élément de qualité biologique donné signifie que la valeur estimée pour cet élément de qualité biologique se situe au-dessus de la limite inférieure du très bon état.

Selon les termes de la DCE, l'attribution d'une classe d'état écologique **très bon ou bon** est déterminée par les valeurs des contrôles des éléments **biologiques, physico-chimiques** (paramètres physico-chimiques généraux et polluants spécifiques de l'état écologique) sur les éléments de qualité pertinents pour le type de masse d'eau considéré, et **hydromorphologiques** dans le cas où tous les éléments biologiques et physico-chimiques correspondent au très bon état.

L'attribution d'une classe d'état écologique **moyen** est obtenue :

- lorsqu'un ou plusieurs des éléments biologiques est (sont) classé(s) moyen(s), les éventuels autres éléments biologiques étant classés bons ou très bons
- ou lorsque tous les éléments biologiques sont classés bons ou très bons, et que l'un au moins des éléments physico-chimiques généraux ou des polluants spécifiques correspond à un état moins que bon²¹.

L'attribution d'une classe d'état écologique **médiocre ou mauvais** est déterminée uniquement par les classes d'état des éléments de qualité biologique.

Ainsi, en particulier, lorsqu'au moins un élément de qualité biologique est en état moyen, médiocre ou mauvais, les éléments de qualité physico-chimique n'ont pas d'incidence sur le classement de l'état écologique. Dans ce cas, la classe d'état attribuée est celle de **l'élément de qualité biologique le plus déclassant**.

Exemple 1 : lorsque l'ensemble des éléments de qualité sont en état bon à l'exception d'un élément de qualité biologique en état médiocre, alors l'état écologique sera médiocre.

Exemple 2 : lorsque l'ensemble des éléments de qualité sont en état bon à l'exception d'un élément de qualité physico-chimique en état moyen, alors l'état écologique sera moyen.

Exemple 3 : lorsque l'ensemble des éléments de qualité sont en état moyen à l'exception d'un élément de qualité physico-chimique en état médiocre, alors l'état écologique sera moyen.

NB : en l'absence de données biologiques, aucun état écologique ne sera calculé, à moins qu'une extrapolation spatiale ne soit possible. Se référer à l'annexe 9.

²⁰ Version du 14/04/2018 consultable sur <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036799936&dateTexte=&categorieLien=id>

²¹ C'est à dire moyen, médiocre ou mauvais pour un élément de qualité physico-chimique général ; non respect de la NQE pour un polluant spécifique de l'état écologique.

2.3.2 Application pratique

En pratique, dans l'attente des résultats finalisés des travaux de définition de l'état écologique, qui conduiront à établir les valeurs-seuils de l'ensemble des éléments de qualité conformément aux prescriptions de la DCE, les règles d'agrégation à appliquer sont présentées ci-après.

2.3.2.1 Agrégation des paramètres au sein des éléments de qualité physico-chimiques généraux

Par analogie avec le principe de l'élément déclassant imposé par la DCE au niveau des éléments de qualité, lorsque **plusieurs paramètres** interviennent pour le même élément de qualité physico-chimique général²², on appliquera le **principe du paramètre déclassant** pour l'agrégation de ces paramètres mentionnés aux annexes 5 (cours d'eau) et 8 (plans d'eau).

Néanmoins, cette règle n'étant pas imposée au niveau des paramètres par la DCE, **son application est adaptée**, suivant les modalités présentées ci-après.

Un élément de qualité physico-chimique général, pour lequel plusieurs paramètres interviennent et qui est déclassé par **un seul paramètre**, pourra être considéré comme en bon état (ou très bon), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- tous les éléments biologiques et les autres éléments physico-chimiques sont classés dans un état bon (ou très bon) ;
- la valeur observée du paramètre déclassant **ne dépasse pas** la valeur-seuil fixée pour ce paramètre à **la limite de la classe immédiatement inférieure**. En d'autres termes, un paramètre pourrait être considéré en classe bon si sa valeur observée reste au sein de la classe moyen (la valeur observée ne va pas au-delà de la limite moyen/médiocre) ; un paramètre pourrait être considéré en classe très bon si sa valeur observée reste au sein de la classe bon (la valeur observée ne va pas au-delà de la limite bon/moyen).

Dans ce cas, le paramètre physico-chimique déclassant sera classé en classe moyen et l'élément de qualité correspondant sera classé en état bon (respectivement le paramètre sera classé bon et l'élément de qualité très bon).

Exception : pour l'élément de qualité nutriment **des cours d'eau**, cette **disposition ne s'applique pas** au paramètre **nitrate**. Une masse d'eau dont le paramètre nitrate est classé en état moins que bon (concentration supérieure à 50 mg/l) est classée en état moyen pour l'élément de qualité nutriments.

NB : en l'absence de données physico-chimiques, la classe de l'état écologique est égale à la classe de l'élément de qualité biologique.

2.3.2.2 Agrégation au sein de l'élément de qualité polluants spécifiques de l'état écologique

Conformément aux principes de la DCE, le bon état est atteint lorsque l'ensemble des polluants spécifiques de l'état écologique respectent leurs normes de qualité environnementale.

²² Par exemple, oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, DBO5 et carbone organique sont des paramètres de l'élément de qualité bilan de l'oxygène.

2.3.2.3 Agrégation entre éléments de qualité

Pour l'agrégation entre éléments de qualité, on appliquera le **principe de l'élément déclassant**, compte-tenu des principes généraux énoncés précédemment et des règles d'agrégation entre éléments de qualité de même nature.

2.3.2.4 Cas particulier de la classification en très bon état écologique

Pour la classification en très bon état écologique, la DCE requiert des conditions pas ou peu perturbées au niveau biologique, hydromorphologique et physico-chimique.

Pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs-seuils du très bon état doivent être adaptées aux différents types de cours d'eau et de plans d'eau. Ainsi :

- pour les cours d'eau, les connaissances actuelles ne permettent pas de fournir des valeurs fiables pour cette limite. Les valeurs fournies dans le présent guide sont à considérer à titre indicatif ;
- pour les plans d'eau, des valeurs fiables ont été déterminées pour les éléments de qualité concentration en nutriments (phosphore total, ammonium et nitrates) et transparence mais pas pour la température, le bilan d'oxygène et la salinité.

Pour les paramètres hydromorphologiques, la classification en très bon état écologique requiert des **conditions hydromorphologiques peu ou pas perturbées** (morphologie, régime hydrologique, continuité pour les cours d'eau). Pour mémoire, ces conditions peu ou pas perturbées sont définies par la DCE de la manière suivante :

Élément de qualité	Très bon état pour les cours d'eau	Très bon état pour les plans d'eau
Régime hydrologique	La quantité et la dynamique du débit, et la connexion résultante aux eaux souterraines, correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.	La quantité et la dynamique du débit, le niveau, le temps de résidence et la connexion résultante aux eaux souterraines correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Continuité de la rivière	La continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments.	
Conditions morphologiques	Les types de chenaux, les variations de largeur et de profondeur, la vitesse d'écoulement, l'état du substrat et tant la structure que l'état des rives correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.	Les variations de profondeur du lac, la qualité et la structure du substrat ainsi que la structure et l'état des rives correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.

Dans l'attente de la détermination des indicateurs et valeurs-seuils pertinents pour les éléments de qualité hydromorphologique, l'attribution de la classe très bon prendra en compte :

- les indicateurs, valeurs-seuils et règles d'agrégation fixés pour les éléments biologiques et physico-chimiques ;
- les conditions normatives définissant le très bon état pour les éléments de qualité hydromorphologiques rappelées dans le tableau ci-dessus ;

- les informations disponibles sur les pressions hydromorphologiques, notamment celles issues du système relationnel d'audit de l'hydromorphologie des cours d'eau (SYRAH-CE). Pour les RUP, les informations disponibles sur les pressions hydromorphologiques, notamment celles issues du référentiel hydromorphologique ultramarin (RHUM) sont à considérer.

En synthèse, et dans l'attente de la détermination des indicateurs et valeurs-seuils pertinents pour l'ensemble des éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques, la **classification en très bon état écologique** d'une station ou d'une masse d'eau est possible lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- pour les cours d'eau :
 - l'ensemble des éléments de qualité biologiques pertinents sont en très bon état ;
 - pas ou très peu de perturbations physico-chimiques et hydromorphologiques résultant de pressions anthropiques ;
 - concentrations en PSEE non synthétiques inférieures aux limites de quantifications listées dans l'avis relatif aux limites de quantification des couples paramètre-matrice de l'agrément des laboratoires en vigueur ;
 - concentrations en PSEE synthétiques non quantifiée et limite de quantification respectant l'avis relatif aux limites de quantification des couples paramètre-matrice de l'agrément des laboratoires en vigueur.
- pour les plans d'eau :
 - l'ensemble des éléments de qualité biologiques pertinents sont en très bon état ;
 - les éléments de qualité concentration en nutriments et transparence sont en très bon état ;
 - pas ou très peu de perturbations des autres éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique résultant de pressions anthropiques ;
 - concentrations en PSEE non synthétiques inférieures aux limites de quantifications listées dans l'avis relatif aux limites de quantification des couples paramètre-matrice de l'agrément des laboratoires en vigueur ;
 - concentrations en PSEE synthétiques non quantifiée et limite de quantification respectant l'avis relatif aux limites de quantification des couples paramètre-matrice de l'agrément des laboratoires en vigueur.

2.3.3 Cas des situations de lacunes de données de surveillance

Plus généralement, lorsque les données de surveillance disponibles ne permettent pas d'attribuer un état à tout ou partie des éléments de qualité pertinents pour le type de masses d'eau considéré, l'état écologique est attribué en corroborant ces données de surveillance par l'ensemble des autres données et connaissances mobilisables :

- sur l'état de la station ou de la masse d'eau ;
- sur les pressions qui s'y exercent et sur leurs impacts sur la structure et le fonctionnement de l'écosystème associé.

En particulier, la période de recherche de données de surveillance doit être élargie afin d'apporter de la donnée mesurée lorsqu'elle existe et qu'elle est significative (représentative de la station ou de la masse d'eau, recueillie avec un protocole DCE-compatible, et à condition qu'il n'y ait pas eu de modification significative de la donnée suite à une amélioration - travaux de restauration - ou une dégradation - rejet nouveau ou modification hydromorphologique). Les résultats fournis par ces données sont alors nécessairement corroborés à dire d'expert au regard des différents types de pressions s'exerçant sur la station ou la masse d'eau, notamment de pollution et hydromorphologiques, pour attribuer un état.

Les modalités de recours à ces données complémentaires sont décrites dans l'annexe 9 du présent guide, qui décrit les principes à appliquer pour évaluer l'état écologique de chaque masse d'eau selon les données et outils disponibles, comme défini à l'annexe 10 (§ 2.1) de l'arrêté évaluation.

2.4 Attribution d'un état écologique à l'échelle de la masse d'eau

Les principes et règles énoncés dans les sections précédentes permettent l'attribution d'un état à l'échelle d'une station d'évaluation, selon différents niveaux d'agrégation (état d'un paramètre, d'un élément de qualité, état écologique agrégé).

Pour autant, certaines masses d'eau ne sont pas directement suivies alors que d'autres disposent de plusieurs stations d'évaluation. Pour ces deux cas, les modalités d'évaluation de l'état écologique sont précisées en annexe 9.

2.5 Attribution d'un niveau de confiance

La DCE impose d'estimer le niveau de confiance des résultats fournis par les programmes de surveillance et de les indiquer dans les plans de gestion des districts hydrographiques. Il s'agit d'attribuer **un niveau de confiance à l'état écologique d'une masse d'eau** (état de la masse d'eau évalué à partir de tous les éléments de qualité pertinents et non élément de qualité par élément de qualité, i.e. selon les règles d'agrégation entre éléments de qualité et les modalités de prise en compte des aspects spatiaux énoncées précédemment).

Trois niveaux de confiance sont distingués : 3 (élevé), 2 (moyen), 1 (faible). Les modalités d'attribution du niveau de confiance sont précisées en **annexe 10**.

2.6 Cas des masses d'eau fortement modifiées (MEFM)

La classification du potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées (MEFM) s'établit en quatre classes : bon et plus ; moyen ; médiocre ; mauvais.

2.6.1 Principes généraux

Dans l'attente d'une amélioration de la définition des classes de potentiel écologique selon une démarche DCE-compatible²³, l'évaluation du potentiel écologique des MEFM est définie par une méthode mixte croisant certaines données disponibles relatives à l'état écologique, pour les éléments de qualité dont les références du potentiel écologique maximal sont disponibles et une **démarche alternative fondée sur les mesures d'atténuation des impacts, , c'est à dire la réduction des pressions hydromorphologiques hors contrainte technique obligatoire (CTO)**.

Cette démarche définit les valeurs correspondant au **bon potentiel écologique** comme étant celles obtenues dans une situation où sont mises en œuvre **toutes les mesures ou combinaison de mesures d'atténuation** des impacts qui :

- ont une **efficacité significative** sur la qualité et la fonctionnalité de la masse d'eau (y compris, par exemple, des mesures concernant l'amélioration des modes de gestion hydraulique ou la maîtrise des flux de nutriments pour contenir l'eutrophisation) ;

²³ Les travaux d'intercomparaison du bon potentiel sont en cours au sein du groupe de travail Ecostat et doivent aboutir fin 2018 par la création d'une annexe à la guidance n° 4 - heavily modified water bodies - HMWB (WG 2.2)

- sont techniquement et socio-économiquement faisables **sans remettre en cause le (ou les) usage(s)** à la base de la désignation comme MEFM, c'est-à-dire qui tiennent compte des contraintes techniques obligatoires (CTO) pour la pratique de cet(ces) usage(s).

À cet égard, il convient de souligner que l'existence d'une **contrainte technique obligatoire** dans un domaine (par exemple une contrainte de marnage fort saisonnier) n'empêche pas la mise en œuvre de mesures d'atténuation des impacts dans ce même domaine (par exemple des modalités de gestion du niveau d'eau d'une retenue limitant l'impact sur les communautés aquatiques).

De plus, comme mentionné précédemment, des mesures peuvent être nécessaires, même lorsque le bon potentiel d'une masse d'eau est atteint, afin de respecter l'objectif de non dégradation de cette masse d'eau ou pour respecter ou atteindre le bon état/potentiel d'autres masses d'eau.

2.6.2 Application pratique

Pour appliquer cette démarche alternative sans procéder à une analyse au cas par cas, il convient de s'appuyer sur une **typologie de cas MEFM (grand type de masse d'eau x type d'ouvrage ou d'aménagement physique)**. Les différents types de cas de MEFM sont homogènes en matière d'altérations hydromorphologiques impactant les éléments de qualité biologique. Cette typologie, élaborée au niveau national, constitue le principal cadre d'analyse pour l'identification des contraintes techniques obligatoires par type de cas de MEFM.

Typologie des cas MEFM :

					Contraintes Techniques Obligatoires										
Usage principal cf.DCE art.4,3	Navigation Hydro-électricité Stockage de ressource AEP irrigation Protection/inondation	Type de cas MEFM		Exemples	Profondeur minimale/maintien d'une ligne d'eau	Obligation d'un certain débit et chute	Marnage fort saisonnier	Marnage faible court terme	Marnage faible	Volume utilisable	Régime restitution	Rectification, déplacement du tracé du CE/Chenal de navigation/Rayon de courbure	Blocage lit mineur	Limitation du champ d'expansion de crues	
Navigation		Grands cours d'eau navigués à petit gabarit (G-TG, en plaine)	1	Doubs	X							X	X		
		(Petite) Rivière de plaine canalisée, à petit gabarit (P-M, en plaine)	2	Sambre	X								X	X	
		Voies d'eau à grand gabarit (G, TG, en plaine)	3	Saône	X								X	X	
		Fleuves Alpins aménagés voie d'eau et hydroélectricité (TTG)	4	Rhône Rhin	X	X					X		X	X	

					Contraintes Techniques Obligatoires										
Usage principal cf.DCE art.4,3	Navigation Hydro-électricité Stockage de ressource AEP irrigation Protection/inondation	Type de cas MEFM		Exemples	Profondeur minimale/maintien d'une ligne d'eau	Obligation d'un certain débit et chute	Marnage fort saisonnier	Marnage faible court terme	Marnage faible	Volume utilisable	Régime restitution	Rectification, déplacement du tracé du CE/Chenal de navigation/Rayon de courbure	Blocage lit mineur	Limitation du champ d'expansion de crues	
Stockage (AEP, hydroélec, irrigation) et régularisation des débits		Retenue à marnage important (> 3m) et cycle annuel (souvent pour hydroélectricité ou soutien d'étiage)	5			X	X			X					
		Retenue à marnage de faible intensité et forte fréquence (quelques jours)	6			X		X		X					
		Retenue à marnage de faibles intensité et fréquence	7						X	X					
			Cours d'eau aval retenue (débit modifié, tronçon court-circuité-TCC), affectés par des modifications morphologiques substantielles ¹	8 9								X			
			Cours d'eau aval restitution (régime modifié, éclusées) affectés par des modifications morphologiques substantielles ¹					X	X		X				
Protection contre les inondations et le drainage des sols		Endiguement étroit² sur rivière à fort transport sédimentaire (tressage)	10										X	X	
		Endiguement étroit² sur rivière à dynamique moyenne à faible (méandrage)	11	Gier										X	X
		Endiguement large³ sur rivière à fort transport sédimentaire (tressage)	12												X
		Endiguement large³ sur rivière à dynamique moyenne à faible (méandrage)	13	Loire											
			Petite rivière rectifiée/reca-librée ou artificielle (marais, zones humides)	14	Limagne							X	X	X	

¹ Les modifications d'ordre hydrologique ne suffisent pas pour désigner des masses d'eau en MEFM ; les types de cas 8 et 9 concernent donc des masses d'eau avec des modifications morphologiques liées aux modifications du débit, substantielles, permanentes et étendues au regard de la taille de la masse d'eau

² Endiguement étroit : inférieure à deux fois la largeur de plein bord

³ Endiguement large : supérieur à deux fois la largeur de plein bord

Définition des contraintes techniques obligatoires (CTO) :

Profondeur minimale/maintien d'une ligne d'eau : pour la navigation, la CTO est de disposer d'une profondeur ou hauteur d'eau (mouillage) suffisante, qui se traduit le plus souvent par un maintien de la ligne d'eau constante (régulation hydraulique et barrage/écluses).

Obligation d'un certain débit et chute : la production d'hydroélectricité se base sur la notion de puissance électrique qui est fonction d'un débit, d'une hauteur de chute et du rendement des turbines installées.

Marnage fort saisonnier : sur les retenues cette contrainte est liée au stockage de la ressource pour la production d'hydroélectricité en périodes de forte demande énergétique (hiver ou été) ou le soutien d'étiage.

Marnage faible court terme et marnage faible saisonnier : liée à une activité de stockage de la ressource (AEP, irrigation, hydroélectricité).

Volume utilisable : liée à une activité de stockage de la ressource (AEP, irrigation, hydroélectricité, soutien d'étiage).

Régime de restitution : à l'aval des retenues les masses d'eau voient leur cycle hydrologique annuel modifié par les usages de l'eau stockée.

Rectification, déplacement du tracé du CE/Chenal de navigation/Rayon de courbure : pour la navigation, la géométrie du chenal (tracé en plan) est très contrainte, mais il existe une certaine marge de manœuvre entre les paramètres largeur et rayon de courbure. Ainsi, à rayon de courbure plus court, une largeur plus ample est nécessaire. Ces contraintes sont plus ou moins faciles à satisfaire en fonction du gabarit et de l'importance/morphologie du cours d'eau.

Le drainage des sols s'est très souvent accompagné, a minima, d'un recalibrage du cours d'eau, voire d'une rectification.

Blocage lit mineur : le blocage du lit mineur n'est en théorie pas indispensable à la navigation, mais dans les faits, étant entendu que le cours d'eau doit passer sous les ponts et passer par les seuils/écluses, la marge de divagation au droit des ouvrages de navigation est quasi nulle.

L'endiguement étroit pour la protection contre les inondations a eu pour but de canaliser les crues et a, de fait, supprimé toutes divagations possible du lit mineur.

Limitation du champ d'expansion de crues dans des zones à enjeu fort dans les zones les plus vulnérables (par exemple, zones urbanisées). Font partie des CTO les ouvrages qui protègent ces zones.

Prise en compte des données milieux disponibles, en se référant :

- dans le cas des MEFM - cours d'eau : aux indicateurs et valeurs-seuils établis sur les **diatomées** (cf. annexe 1) et sur les éléments **physico-chimiques** (cf. annexe 5 relative aux paramètres physico-chimiques généraux et annexe 6 relative aux polluants spécifiques de l'état écologique) en appliquant les règles d'agrégation mentionnées au paragraphe 2.3 ;
- dans le cas des MEFM - plans d'eau : aux indicateurs, valeurs-seuils et lignes directrices établis pour les plans d'eau d'origine anthropique sur le **phytoplancton** (cf. annexe 7) et sur les éléments **physico-chimiques** (cf. annexe 8 relative aux paramètres physico-chimiques généraux et annexe 6 relative aux polluants spécifiques de l'état écologique), en appliquant les règles d'agrégation mentionnées au paragraphe 2.3.

Identification des mesures d'atténuation

On considère que les pressions hydromorphologiques hors CTO se traduisent par un effet négatif sur les potentialités biologiques des masses d'eau.

Les mesures spécifiques pour atténuer ces pressions sont à identifier. Elles sont à hiérarchiser en fonction des effets attendus sur la réduction des pressions. On considère que le bon potentiel est atteint lorsque toutes les mesures d'atténuation jugées les plus efficaces ont été réalisées.

Attribution de la classe de potentiel écologique selon les principes suivants :

		Classes d'état selon les indicateurs biologiques et physico-chimiques mentionnés ci-dessus				
		Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
Pressions hydromorphologiques identifiées (hors CTO, à savoir celles imposées par l'usage)	Nulles à faibles	Bon potentiel écologique	Bon potentiel écologique	Potentiel écologique moyen	Potentiel écologique médiocre	Potentiel écologique mauvais
	Moyennes à fortes	Potentiel écologique moyen	Potentiel écologique moyen	Potentiel écologique moyen	Potentiel écologique médiocre	Potentiel écologique mauvais

2.7. Cas des masses d'eau artificielles (MEA)

La **démarche** alternative **fondée sur les mesures d'atténuation des impacts**, décrite au paragraphe 2.6.1. pour attribuer un potentiel écologique aux masses d'eau fortement modifiées (MEFM) **est transposable aux masses d'eau artificielles (MEA)**.

3. RÈGLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE

3.1. Données mobilisables

Pour pouvoir attribuer un état chimique à chacune des masses d'eau, il est indispensable de s'appuyer sur l'ensemble des informations adéquates disponibles. C'est pourquoi, on utilisera prioritairement les données sur les paramètres définissant l'état chimique acquises à partir des réseaux établis dans le cadre de l'application de la DCE (réseau de contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, réseau de référence), mais aussi celles issues d'autres réseaux, dès lors que les sites de suivi sont représentatifs de l'état d'une masse d'eau, qu'ils sont situés hors zone de mélange et que les protocoles de prélèvement et d'analyse sont conformes à ceux prescrits dans le cadre des réseaux DCE (préconisations de l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010 modifié).

L'évaluation de l'état se base sur les données de la campagne de suivi la plus récente. En outre, les résultats des campagnes précédentes pourront également être utilisés afin de vérifier la cohérence et la pertinence de cette dernière année.

3.2. Indicateurs, valeurs-seuils et modalités de calcul (intégration temporelle par indicateurs)

3.2.1. Paramètres et normes de qualité environnementale

La liste des paramètres et de leurs normes de qualité environnementale (NQE) à respecter pour atteindre le bon état chimique des eaux est présentée en annexe 11. Ces valeurs sont issues de la directive 2008/105/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, modifiée par la directive 2013/39/UE.

Pour les substances prioritaires ajoutées par la directive 2013/39/UE, les normes de qualité environnementale prennent effet à partir du 22 décembre 2018, c'est-à-dire pour l'état des lieux 2019, en vue d'atteindre un bon état chimique pour ces substances au plus tard le 22 décembre 2027.

Pour les substances prioritaires dont la NQE a été révisée par la directive 2013/39/UE, les normes de qualité révisées ont pris effet le 22 décembre 2015, en vue d'atteindre un bon état chimique pour ces substances au plus tard le 22 décembre 2021.

Un paramètre correspond à une substance ou à un groupe de substances. Sauf indication contraire, **la valeur du paramètre à considérer est la somme des concentrations de tous les isomères** de cette substance ou de ce groupe de substances.

On notera que :

- les NQE sont exprimées en valeur moyenne annuelle (NQE_MA) et également pour la plupart des paramètres en concentration maximale admissible (NQE_CMA) ;
- des NQE distinctes sont définies pour les eaux douces de surface et pour les eaux côtières et de transition ;
- les NQE sont définies dans la matrice eau et/ou la matrice biote ;

- dans la matrice eau, les NQE s'appliquent sur eau brute, à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau (obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 micromètres ou par tout autre traitement préliminaire équivalent) ;
- dans la matrice biote, les NQE se rapportent à une concentration moyenne annuelle de poids frais ;
- pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :
 - de la dureté²⁴, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model)
 - des concentrations de fonds géochimiques naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE.

Un guide européen est en cours de rédaction pour préciser la prise en compte de ces deux aspects et prévu pour fin 2018.

Lorsqu'un paramètre ne dispose pas d'une NQE dans le biote, le bon état pour ce paramètre est atteint lorsque l'ensemble des NQE (NQE_CMA et NQE_MA) est respecté. Les modalités de respect des NQE_CMA et NQE_MA sont précisées ci-après.

Lorsqu'un paramètre dispose d'une NQE dans le biote, le bon état pour ce paramètre est atteint lorsque la NQE_biote en concentration moyenne annuelle est respectée. Le respect de la NQE-CMA correspondante, si elle existe, doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Lorsqu'un paramètre dispose d'une NQE_MA dans l'eau et d'une NQE_biote, le respect de la NQE_MA peut être évalué sur l'une ou l'autre de ces normes, en fonction de la matrice qui a été suivie pour ce paramètre. Néanmoins, on utilisera en priorité la NQE_biote dans la mesure où il s'agit de la matrice la plus pertinente et compte tenu des valeurs très basses des NQE_MA correspondantes dans l'eau.

Des NQE exprimées en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus et en annexe 11 peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :

- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau en annexe 11 ;

ET

- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 1/3 de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k=2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée dans le tableau en annexe 11.

²⁴ Le calcul de la classe de dureté est opéré, dans le cas du cadmium, par la moyenne des concentrations en calcium et magnésium obtenues sur les trois dernières années. En revanche dans le cas du recours aux BLM il est recommandé d'associer préférentiellement à chaque concentration en élément métallique une mesure de dureté du jour (à défaut la moyenne sur 3 ans pourra être utilisée pour combler les données historiques lacunaires).

3.2.2. Modalités de calcul

3.2.2.1. Évaluation de l'état d'un paramètre (une substance ou groupe de substances)

Préambule

Le suivi des polluants dans les eaux ne permet pas d'obtenir une valeur exacte de leur concentration mais un encadrement de cette valeur :

- d'une part, parce qu'à toute mesure, est liée une incertitude analytique (U) ;
- d'autre part, parce que la résolution analytique des laboratoires est limitée : en-dessous d'un certain niveau, la concentration d'un polluant ne peut plus être quantifiée, il s'agit de la limite de quantification (LQ).

Incertitude analytique et limite de quantification varient en fonction des capacités des laboratoires mais aussi et surtout en fonction des polluants à analyser. La directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009 dite QA/QC définit que les méthodes d'analyse doivent permettre d'atteindre des limites de quantification doivent être inférieures ou égales à 30% des NQE en garantissant une incertitude élargie de mesure inférieure à 50%. Lorsque ces standards ne peuvent être atteints, il convient d'utiliser les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Respect des normes NQE_CMA et NQE_MA sur eau

I. NQE_CMA : Norme de qualité environnementale en Concentration Maximale Admissible

Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année²⁵ et que l'on dispose d'au moins quatre mesures sur cette période, on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE_CMA :

- si elle lui est supérieure, la NQE-CMA n'est pas respectée
- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE_CMA est respectée.


Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE_CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) :

- lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE_CMA, la norme est respectée ;
- lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE_CMA on ne se prononce pas.

La directive 2008/105/CE modifiée prévoit également la possibilité d'utiliser des méthodes statistiques, tel que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA (annexe 1, partie B). En l'absence de consensus au niveau national sur l'application de ces méthodes et compte tenu du nombre limité de valeurs utilisées pour évaluer l'état, le recours à ces méthodes n'est pas recommandé.

²⁵ Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.

Représentation schématique :



II. NQE_MA : Norme de qualité environnementale en concentration Moyenne Annuelle

Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles.

Dans le calcul de la moyenne, une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant "inférieure à la limite de quantification".

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE-MA :

- et que la valeur moyenne calculée est inférieure à la NQE-MA, alors la NQE-MA est respectée ;
- et que la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE-MA, alors la NQE-MA n'est pas respectée.

Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE-MA :

- et que la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification, alors la NQE-MA n'est pas respectée ;
- et que la valeur moyenne calculée est strictement inférieure à la limite de quantification, alors le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau.

Cas des familles de substances

Les concentrations de chaque substance faites pour chaque prélèvement sont sommées par famille. Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro.

La concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.


Si la limite de quantification maximale des substances individuelles de la somme est inférieure ou égale à la NQE-MA :

- et que la valeur moyenne calculée est inférieure à la NQE-MA, alors la NQE-MA est respectée ;
- et que la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE-MA, alors la NQE-MA n'est pas respectée.

Si la limite de quantification maximale des substances individuelles de la somme est supérieure à la NQE-MA :

- et que la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification, alors la NQE-MA n'est pas respectée ;
- et que la valeur moyenne calculée est strictement inférieure à la limite de quantification, alors le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau.

Représentation schématique pour l'évaluation de la conformité à la NQE-MA



Respect des normes sur biote

La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle (six ans) est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.

Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe précédent s'appliquent.

État du paramètre : agrégation NQE_CMA – NQE_MA ; et respect de la NQE biote

Lorsqu'une norme en concentration maximale admissible existe et qu'elle est pertinente²⁶ on évalue tout d'abord l'état du paramètre au regard de cette NQE_CMA :

- si la NQE_CMA n'est pas respectée alors l'état du paramètre est mauvais ;
- sinon on s'intéresse à la norme en valeur moyenne annuelle (NQE_MA) :
 - lorsqu'elle n'est pas respectée, l'état du paramètre est mauvais ;
 - lorsqu'il n'a pas été possible de se prononcer pour le respect de la NQE_MA, l'état du paramètre est inconnu ;
 - sinon l'état du paramètre est bon.

Lorsqu'aucune NQE_CMA n'est définie pour le paramètre, l'état de ce paramètre dépend uniquement du respect de la NQE_MA.

3.2.2.2. Évaluation de l'état chimique à l'échelle d'une station (répondant aux critères énoncés en 3.1)

État chimique d'une station

L'état chimique de la station en fonction de l'état des paramètres qui définissent l'état chimique des eaux est défini de la manière suivante :

- lorsque l'un au moins de ces paramètres est en mauvais état alors la station est en mauvais état chimique quel que soit l'état des autres paramètres, même si certains d'entre eux ne sont pas connus ;
- lorsque l'ensemble des paramètres est en état inconnu, alors la station est en état inconnu ;
- dans les autres cas, la station est en bon état.

Un nombre minimal de paramètres pour calculer l'état chimique n'est pas fixé, mais le nombre de paramètres entrant dans le calcul (i.e. ayant un nombre d'analyses supérieur ou égal à quatre) est indiqué et influe sur l'indice de confiance.

État incluant/excluant certaines catégories de substances

En complément des cartes de l'état chimique incluant l'ensemble des substances prioritaires et dangereuses prioritaires, la directive 2008/105/CE modifiée prévoit la possibilité d'établir des cartes additionnelles excluant certaines substances :

- une carte présentant l'état chimique excluant les substances identifiées comme PBT²⁷ ubiquistes (numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43, 44 dans l'annexe 11) ;
- une carte présentant l'état chimique excluant les nouvelles substances prioritaires identifiées par la directive 2013/39/UE (numérotées 34 à 45 dans l'annexe 11) ;
- une carte présentant l'état chimique excluant les substances pour lesquelles une NQE plus stricte a été établie par la directive 2013/39/UE (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l'annexe 11).

²⁶ Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

²⁷ PBT : persistante, bioaccumulable et toxique.

Ces différents modes de représentation de l'état chimique doivent permettre de mieux mettre en avant les progrès accomplis et de relativiser l'effet thermomètre liées aux mises à jour régulières des listes de substances et des NQE associées.

Pour aller plus loin sur l'étendue des paramètres de l'état chimique pouvant impacter les organismes vivants, on pourra se référer à l'indicateur gradué et agrégé basé sur la sensibilité de taxons appartenant à 3 niveaux trophiques différents (cf. annexe 12) qui peut également apporter des éléments de réponse pour évaluer l'état des eaux à la station sans que des réponses soient fournies substance par substance.

3.3. Attribution d'un état à l'échelle d'une masse d'eau

3.3.1. Masses d'eau disposant d'une ou plusieurs stations répondant aux critères énoncés au 3.1

Pour les masses d'eau disposant de plusieurs sites d'évaluation représentatifs de l'état de la masse d'eau, l'état chimique de la masse d'eau correspond :

- à l'état chimique de ces stations lorsqu'ils coïncident ;
- sinon, à l'état chimique de la station la plus déclassante.




3.3.2. Masses d'eau ne disposant pas de stations répondant aux critères énoncés au 3.1

Pour les masses d'eau ne disposant pas de stations représentatives de la masse d'eau sur lesquelles les méthodes de suivi répondent aux préconisations de l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, il sera fait appel à l'ensemble des informations disponibles ou modélisables. On pourra par exemple procéder par analogie (regroupement par masses d'eau cohérentes), par modélisation des pressions ou encore s'appuyer sur le dire d'expert.

3.3.3. Représentation de l'état d'une masse d'eau

On associe un code couleur à l'état de chaque masse d'eau. Bleu pour le bon état, rouge pour le mauvais état et gris pour les cas pour lesquels on ne se prononce pas.

Code couleur pour l'état d'une masse d'eau :

Bon état	
État inconnu	
Mauvais état	

3.4. Attribution du niveau de confiance de l'état chimique

Le niveau de confiance attribué à l'état d'une masse d'eau est déterminé de la manière suivante :

INFORMATION DISPONIBLE SUR LA MASSE D'EAU			NIVEAU de confiance associé
Masse d'eau suivie directement	La station est en mauvais état	La station a fait l'objet d'un suivi dans la matrice biote pour les substances disposant d'une NQE dans cette matrice	élevé
		La station est déclassée par une substance disposant d'une NQE dans le biote mais dont l'état n'a pas été évalué sur cette matrice	moyen
	La station est en bon état	Et on peut se prononcer sur le bon état d'au moins 80 % des 53 polluants incluant benzo(a)pyrène, fluoranthène et DEHP. La station a fait l'objet d'un suivi dans la matrice biote pour les substances disposant d'une NQE définie dans cette matrice.	élevé
		Et on peut se prononcer sur le bon état de 50 à 80% des 53 paramètres incluant benzo(a)pyrène, fluoranthène et DEHP	moyen
		Et on ne peut pas se prononcer sur le bon état d'au moins 50 % des polluants	faible
		Et on ne peut pas se prononcer pour l'un au moins des polluants benzo(a)pyrène, fluoranthène et DEHP	
Masse d'eau non suivie directement	Il est avéré qu'il n'y a pas de pressions anthropiques, la station est considérée en bon état		moyen
	Des méthodes de modélisation de l'état peuvent être utilisées (par regroupement de masses d'eau, modélisation des pressions...)		faible
	Aucune information n'est disponible (la modélisation n'est pas possible, la masse d'eau ne peut pas être groupée à des masses d'eau similaires pour lesquels on dispose de l'information))		Information insuffisante pour attribuer un état

La fréquence de suivi de certains paramètres de l'état chimique ayant été revue suite au premier cycle de surveillance, certains bassins ne sont plus dans l'obligation de les suivre. Les fréquences par paramètre et par bassin sont indiquées dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux (annexe VI, tableaux 47 pour les cours d'eau et 49 pour les plans d'eau). Dans le cas où un paramètre n'est plus à suivre conformément à cet arrêté, il n'est pas pris en compte dans le calcul de l'indice de confiance.

ANNEXE 1 : ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU – INDICES BIOLOGIQUES POUR LA MÉTROPOLE

Indice pour le phytoplancton

Le suivi de l'élément de qualité phytoplancton est considéré comme pertinent uniquement pour les très grands cours d'eau. A ce stade, aucun indice biologique permettant d'évaluer l'état des eaux sur la base de l'élément de qualité phytoplancton n'a été développé pour les cours d'eau français.

Des travaux ont été engagés au cours du second cycle DCE afin de pouvoir disposer d'un tel indice dans l'optique du 3^e cycle (2022-2027).

Indice pour les macrophytes : indice biologique macrophytique en rivière (code Sandre : 2928)

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée}) / (\text{note de référence du type})$$

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IBMR :

ÉLÉMENTS DE QUALITE	INDICE	LIMITES DES CLASSES D'ÉTAT IBMR en EQR			
		[Très bon / Bon[[Bon / Moyen[[Moyen / Médiocre[[Médiocre / Mauvais]
Macrophytes	IBMR	0,92	0,77	0,64	0,51

Les valeurs de l'IBMR figurant dans ce tableau ont pris en compte la décision de la commission du 12 février 2018 relative à l'inter-étalonnage.

Valeurs de référence, par type de cours d'eau, pour l'IBMR

Valeurs de référence pour l'IBMR		Catégories de tailles de cours d'eau					
Hydroécorégions de niveau 1		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
20	DÉPÔTS ARGILO SABLEUX	Cas général		11,17		13,09	13,09
		Exogène de l'HER 9		11,17			
		Exogène de l'HER 21					
21	MASSIF CENTRAL NORD	Cas général		13,09	13,17	13,17	14,61
3	MASSIF CENTRAL SUD	Cas général		9,38	13,17	14	14
		Exogène de l'HER 19			12,94		
		Exogène de l'HER 8			13,17		
		Exogène de l'HER 19 ou 8		9,38			
17	DÉPRESSIONS SÉDIMENTAIRES	Cas général			11,17	11,17	11,17
		Exogène de l'HER 3 ou 21	9,38	9,38	11,17	11,17	14
15	PLAINE SAÔNE	Exogène de l'HER 3 ou 21					
		Exogène de l'HER 5		11,17	11,17		
		Cas général	9,38		11,17		12,94
		Exogène de l'HER 4	9,38				
5	JURA / PRÉ-ALPES DU NORD	Cas général		11,17	12,94	12,94	12,94
		Exogène de l'HER 2	9,38	11,17			
TTGA	FLEUVES ALPINS	Cas général	9				
2	ALPES INTERNES	Cas général			#		
7	PRÉ-ALPES DU SUD	Cas général		11,17			11,17
		Exogène de l'HER 2	9,38	11,17			
6	MÉDITERRANÉE	Exogène de l'HER 2 ou 7		11,17			
		Exogène de l'HER 7		11,17			
		Exogène de l'HER 8	9,38	11,17			
		Exogène de l'HER 1	9,38	11,17			
		Cas général		11,17	11,17		11,17
8	CÉVENNES	Cas général		13,09		14	
		A-her2 n°70			13,17	14,61	
16	CORSE	A-her2 n°22		13,09	13,17	13,17	
		B-her2 n°88			13,17	13,17	
19	GRANDS CAUSSES	Cas général				12,94	
		Exogène de l'HER 8		12,94			

Valeurs de référence pour l'IBMR		Catégories de tailles de cours d'eau					
Hydroécorégions de niveau 1		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
11	CAUSSES AQUITAINS	Cas général				12,94	11,17
		Exogène de l'HER 3 et/ou 21	9,38	9,38	11,17	11,17	
14	CÔTEAUX AQUITAINS	Exogène des HER 3, 8, 11 ou 19	9,38	9,38	11,17		
		Exogène de l'HER 3 ou 8			12,94		
		Cas général		11,17		11,17	11,17
		Exogène de l'HER 1	9,38	9,38	12,94	11,17	
13	LANDES	Cas général			13,09	13,09	13,09
1	PYRENEES	Cas général		12,94	12,94	12,94	12,94
12	ARMORICAIN	A-Centre-Sud		13,09	13,09	13,09	13,09
		B-Ouest-Nord Est			13,09	13,09	13,09
TTGL	LA LOIRE	Cas général	9				
9	TABLES CALCAIRES	A-her2 n°57			11,17	11,17	
		Cas général	9,38	9,38	9,38	11,17	11,17
		Exogène de l'HER 10		9,38	9,38		
		Exogène de l'HER 21	9,38	9,38	9,38		
Exogène de l'HER 21							
10	CÔTES CALCAIRES EST	Cas général	9,38	9,38	9,38	11,17	11,17
		Exogène de l'HER 4			14,61		
		Cas général		11,17	14,61	14,61	14,61
4	VOSGES	Cas général					
22	ARDENNES	Exogène de l'HER 10	9,38				
		Cas général		11,17		13,09	14,61
18	ALSACE	Cas général			11,17		11,17
		Exogène de l'HER 4		11,17	11,17	14,61	

En grisé foncé : type inexistant dans la typologie nationale des cours d'eau

: absence de référence. HER non concernée par le suivi macrophytes

En grisé clair : valeur approximative provisoire, absence de référence

Indice pour le phytobenthos : indice biologique diatomées (code Sandre : 5856)

La note en EQR se calcule comme suit :

Note en EQR = (note observée - note minimale du type) / (note de référence du type - note minimale du type)

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IBD :

Valeurs inférieures des limites de classe de l'IBD	Limites des classes d'état IBD en EQR			
	Très bon / Bon	Bon / Moyen	Moyen / Médiocre	Médiocre / Mauvais
Tous types de cours d'eau sauf TGCE > 10 000 km ² de bassin versant	0,94	0,78	0,55	0,3
Très grands cours d'eau ≥ 10 000 km ² de bassin versant (**)	0,92	0,76	0,52	0,26

Les valeurs d'EQR de l'IBD figurant dans ce tableau ont pris en compte la décision de la commission du 12 février 2018 relative à l'inter-étalonnage.

Valeurs de référence et valeurs minimales, par type de cours d'eau, pour l'IBD

Valeur de référence et valeur minimale par type (IBD)		Catégories de tailles de cours d'eau					
Hydroécorégions de niveau 1	Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands (**) ≥ 10 000 km ²	Très Grands (*) < 10 000 km ²	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
	Exogène de l'HER 9			18,1-1			
	Exogène de l'HER 21			19-5			
21	MASSIF CENTRAL NORD			19-5			
3	Cas général			19-5			
	Exogène de l'HER 19				18,1-1		
	Exogène de l'HER 8				19-5		
	Exogène de l'HER 19 ou 8			18,1-1			

Valeur de référence et valeur minimale par type (IBD)		Catégories de tailles de cours d'eau						
Hydroécorégions de niveau 1		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands (**) ≥ 10 000 km ²	Très Grands (*) < 10 000 km ²	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
17	DÉPRESSIONS SÉDIMENTAIRES	Cas général				17,4-1		
		Exogène de l'HER 3 ou 21	18,1-1	18,1-1	19-5			
15	PLAINE SAÔNE	Exogène de l'HER 3 ou 21				19-5		
		Exogène de l'HER 5			20-5			
		Cas général	18,1-1	18,1-1		18,1-1		
		Exogène de l'HER 4	18,1-1	18,1-1				
5	JURA / PRE-ALPES DU NORD	Cas général			20-5			
		Exogène de l'HER 2	19,1-1	20-5	20-5			
TTGA	FLEUVES ALPINS (***)	Rhin, Rhône jusqu'à Lyon	19,1-1					
TTGA	FLEUVES ALPINS (****)	Rhône de l'aval confluence Saône à Lyon jusqu'à l'exutoire	18,1-1					
2	ALPES INTERNES	Cas général			20-5			
7	PRÉ-ALPES DU SUD	Cas général			20-5			
		Exogène de l'HER 2	19,1-1	20-5	20-5			
6	MÉDITERRANÉE	Exogène de l'HER 2 ou 7					20-5	
		Exogène de l'HER 7			20-5			
		Exogène de l'HER 8		18,1-1	19-5			
		Exogène de l'HER 1			20-5			
		Cas général			18,1-1			
8	CÉVENNES	Cas général			19-5			
		A-her2 n°70				19-5		

Valeur de référence et valeur minimale par type (IBD)			Catégories de tailles de cours d'eau				
Hydroécorégions de niveau 1	Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands (**) ≥ 10 000 km ²	Très Grands (*) < 10 000 km ²	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
16	CORSE	A-her2 n°22			19-5		
		B-her2 n°88			19-5		
19	GRANDS CAUSSES	Cas général					18,1-1
		Exogène de l'HER 8			19-5		
11	CAUSSES AQUITAINS	Cas général					18,1-1
		Exogène de l'HER 3et/ ou 21	19,1-1	19-5	19-5		
14	CÔTEAUX AQUITAINS	Exogène des HER 3, 8, 11 ou 19	18,1-1	18,1-1	18,1-1		
		Exogène de l'HER 3 ou 8			18,1-1		
		Cas général			18,1-1		
		Exogène de l'HER 1	18,1-1	18,1-1	20-5		
13	LANDES	Cas général			18,4-5		
1	PYRÉNNEES	Cas général			20-5		
12	ARMORICAIN	A-Centre-Sud			17,4-1		
		B-Ouest-Nord Est			17,4-1		
TTGL	LA LOIRE	Cas général	18,1-1	18,1-1			
9	TABLES CALCAIRES	A-her2 n°57				18,1-1	
		Cas général	18,1-1		18,1-1		
		Exogène de l'HER 10			18,1-1		
		Exogène de l'HER 21	18,1-1	18,1-1	19-5		
10	CÔTES CALCAIRES EST	Exogène de l'HER 21			19-5		
		Cas général			18,1-1		
		Exogène de l'HER 4	18,1-1	18,1-1	19-5		
4	VOSGES	Cas général			19-5		

Valeur de référence et valeur minimale par type (IBD)		Catégories de tailles de cours d'eau					
Hydroécorégions de niveau 1	Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands (**) ≥ 10 000 km ²	Très Grands (*) < 10 000 km ²	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
		Cas général			17,4-1		
18	ALSACE	Cas général				18,1-1	
		Exogène de l'HER 4			19-5		

(*) : Cours d'eau classés TGCE selon la typologie nationale, mais dont la surface intégrée de bassin versant n'atteint pas 10 000 km² au site d'observation

(**) : Cours d'eau classés TGCE selon la typologie européenne du GIG Large Rivers (tous cours d'eau dont la surface intégrée de bassin versant atteint ou dépasse 10 000 km² au site d'observation)

(***) : Le type TTGA de la typologie nationale, pour les masses d'eau se trouvant dans le Rhin, ou dans le Rhône à l'amont de Lyon, pourra être désigné « TTGA1 »

(****) : Le type TTGA de la typologie nationale, pour les masses d'eau se trouvant dans le Rhône à l'aval de sa confluence avec la Saône à Lyon, pourra être désigné « TTGA2 »

En grisé : type inexistant

a-b : a = valeur de référence ; b = valeur minimale

Les valeurs de l'IBD figurant dans ce tableau ont pris en compte la décision de la commission du 12 février 2018 relative à l'inter-étalonnage pour les cours d'eau.

Indice pour la faune benthique invertébrée : indice invertébrés multimétrique (code Sandre : 7613)

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type* de cours d'eau pour l' $I_{2}M_{2}$

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR $I_{2}M_{2}$		Catégories de tailles de cours d'eau					
Hydroécorégions de niveau 1		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
20	DÉPÔTS ARGILO SABLEUX	Cas général		0,665-0,443-0,295-0,148			
		Exogène de l'HER 9		0,665-0,443-0,295-0,148			
		Exogène de l'HER 21		0,665-0,498-0,332-0,166	0,665-0,443-0,295-0,148		
21	MASSIF CENTRAL NORD	Cas général			0,665-0,443-0,295-0,148		
3	MASSIF CENTRAL SUD	Cas général		0,665-0,498-0,332-0,166	0,665-0,443-0,295-0,148		
		Exogène de l'HER 19			0,665-0,498-0,332-0,166		
		Exogène de l'HER 8					
		Exogène de l'HER 19 ou 8		0,665-0,498-0,332-0,166			
17	DÉPRESSIONS SÉDIMENTAIRES	Cas général			#	0,665-0,498-0,332-0,166	0,665-0,443-0,295-0,148
		Exogène de l'HER 3 ou 21	#	0,665-0,443-0,295-0,148	0,665-0,443-0,295-0,148	0,665-0,443-0,295-0,148	#
15	PLAINE SAÔNE	Exogène de l'HER 3 ou 21					
		Exogène de l'HER 5		#	0,665-0,443-0,295-0,148		
		Cas général	#		0,665-0,443-0,295-0,148		
		Exogène de l'HER 4	#				
5	JURA / PRÉ-ALPES DU NORD	Cas général		0,665-0,498-0,332-0,166	0,605-0,354-0,236-0,118		
		Exogène de l'HER 2	#	0,665-0,46-0,306-0,153			
TTGA	FLEUVES ALPINS	Cas général	#				
2	ALPES INTERNES	Cas général		0,665-0,46-0,306-0,153			
7	PRÉ-ALPES DU SUD	Cas général		0,676-0,464-0,31-0,155			

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR I.M ₂			Catégories de tailles de cours d'eau				
Hydroécorégions de niveau 1		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
7	PRÉ-ALPES DU SUD	Exogène de l'HER 2	#	0,665-0,46-0,306-0,153			
6	MÉDITERRANÉE	Exogène de l'HER 2 ou 7			0,665-0,498-0,332-0,166		
		Exogène de l'HER 7		0,665-0,498-0,332-0,166			
		Exogène de l'HER 8	#	0,665-0,498-0,332-0,166			
		Exogène de l'HER 21					
		Cas général		0,665-0,498-0,332-0,166	0,676-0,464-0,31-0,155		
8	CÉVENNES	Cas général		0,665-0,498-0,332-0,166		0,676-0,464-0,31-0,155	
16	CORSE	A-her2 n°70		0,676-0,464-0,31-0,155			
		A-her2 n°22		0,676-0,464-0,31-0,155			
19	GRANDS CAUSSES	B-her2 n°88		0,665-0,498-0,332-0,166	0,676-0,464-0,31-0,155	#	#
		Cas général				0,665-0,498-0,332-0,166	
11	CAUSSES AQUITAINS	Exogène de l'HER 8	#	0,665-0,498-0,332-0,166	0,665-0,443-0,295-0,148		
		Cas général				0,665-0,498-0,332-0,166	
14	CÔTEAUX AQUITAINS	Exogène des HER 3, 8, 11 ou 19	#	0,665-0,498-0,332-0,166	0,665-0,443-0,295-0,148		
		Exogène de l'HER 3 ou 8					
		Cas général		0,665-0,443-0,295-0,148		0,665-0,498-0,332-0,166	
		Exogène de l'HER 1	#	0,665-0,498-0,332-0,166		0,665-0,46-0,306-0,153	
13	LANDES	Cas général			0,665-0,443-0,295-0,148		

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR I ₂ M ₂			Catégories de tailles de cours d'eau				
Hydroécorégions de niveau 1		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
1	PYRÉNÉES	Cas général		0,665-0,46-0,306-0,153			
12	ARMORICAIN	A-Centre-Sud		0,665-0,443-0,295-0,148	0,665-0,443-0,295-0,148		
		B-Ouest-Nord Est					
TTGL	LA LOIRE	Cas général	#				
9	TABLES CALCAIRES	A-her2 n°57			0,665-0,443-0,295-0,148		
		Cas général	#	0,665-0,443-0,295-0,148			
		Exogène de l'HER 10		0,665-0,443-0,295-0,148			
9	TABLES CALCAIRES	Exogène de l'HER 21	#	0,665-0,443-0,295-0,148			
10	CÔTES CALCAIRES EST	Exogène de l'HER 21					
		Cas général	#	0,665-0,443-0,295-0,148		0,665-0,498-0,332-0,166	
		Exogène de l'HER 4		0,665-0,498-0,332-0,166	0,665-0,443-0,295-0,148		
4	VOSGES	Cas général			0,665-0,443-0,295-0,148		
22	ARDENNES	Exogène de l'HER 10	#				
		Cas général		0,665-0,498-0,332-0,166		0,665-0,443-0,295-0,148	
18	ALSACE	Cas général			0,665-0,443-0,295-0,148		
		Exogène de l'HER 4		0,665-0,443-0,295-0,148			

* Lorsque plusieurs types d'une même HER sont concernés par une valeur de référence et des valeurs seuils de limites de classes identiques, alors ces types sont regroupés, par soucis de simplification, au sein d'une même cellule dans le présent tableau.

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

: absence de référence.

En grisé : type inexistant

Indice pour la faune benthique invertébrée : indice biologique global normalisé (code Sandre : 5910 et 6951)

De manière temporaire pour le prochain cycle, il est possible en lieu et place de l'I2M2 pour l'HER 9A d'utiliser l'indice dit « équivalent » (phases A+B) de la méthode macro-invertébrés NF T90-333. L'indice est calculé au moyen des règles de calcul de la méthode IBGN (NF T90-350 – mars 2004) sur les phases A et B de la norme NF T90-333 de septembre 2016 (code Sandre 5910).

Pour les cours d'eau profond, l'indice biologique invertébrés à utiliser est l'indice macro-invertébrés grands cours d'eau (MGCE 12 prélèvements – code Sandre 6951). L'indice est calculé au moyen des règles de calcul de la méthode IBGN (NF T90-350 – mars 2004) sur l'ensemble des phases comprenant les 12 prélèvements élémentaires du protocole expérimental d'échantillonnage des macro-invertébrés en cours d'eau profond de P. Usseglio Polatera, J.G. Wasson et V. Archambault, déc. 2009 out protocole ultérieur ou norme actualisant ce dernier.

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée} - 1) / (\text{note de référence du type} - 1)$$

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type* de cours d'eau pour l'EQR-équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR-équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et de l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds		Catégories de tailles de cours d'eau					
		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
Hydroécocorégions de niveau 1							
20	DEPÔTS ARGILO SABLEUX	Cas général		0,93333-0,80000-0,53333-0,33333			
		Exogène de l'HER 9		0,92857-0,78571-0,57142-0,28571			
		Exogène de l'HER 21		#	0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		
21	MASSIF CENTRAL NORD	Cas général		#	0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		
3	MASSIF CENTRAL SUD	Cas général		#	0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		
		Exogène de l'HER 19			0,94117-0,82352-0,52940-0,29411		
		Exogène de l'HER 8			0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR-équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et de l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds		Catégories de tailles de cours d'eau					
		Hydroécocorégions de niveau 1	Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits
3	MASSIF CENTRAL SUD	Exogène de l'HER 19 ou 8		0,94117-0,82352-0,52940-0,29411			
17	DÉPRESSIONS SÉDIMENTAIRES	Cas général			0,93333-0,80000-0,53333-0,33333		
		Exogène de l'HER 3 ou 21	#	#	0,94444-0,77777-0,55555-0,27777	0,94444-0,77777-0,55555-0,27777	
15	PLAINE SAÔNE	Exogène de l'HER 3 ou 21			0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		
		Exogène de l'HER 5		#	0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		
		Cas général	#		0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		
		Exogène de l'HER 4	#				
5	JURA / PRÉ-ALPES DU NORD	Cas général		#	0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		
		Exogène de l'HER 2	#		0,92857-0,71428-0,50000-0,28571		
TTGA	FLEUVES ALPINS	Cas général	#				
2	ALPES INTERNES	Cas général			0,92857-0,71428-0,50000-0,28571		
7	PRE-ALPES DU SUD	Cas général			1,00000-0,78571-0,57142-0,28571		
		Exogène de l'HER 2			1,00000-0,76923-0,53846-0,30769		
6	MÉDITERRANÉE	Exogène de l'HER 2 ou 7	#		1,00000-0,80000-0,53333-0,33333		
		Exogène de l'HER 7			1,00000-0,80000-0,53333-0,33333		
		Exogène de l'HER 8			0,93333-0,80000-0,53333-0,33333		
		Exogène de l'HER 1	#		0,93750-0,81250-0,56250-0,31250		
		Cas général			0,93750-0,81250-0,56250-0,31250		

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR-équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et de l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds		Catégories de tailles de cours d'eau					
		Hydroécocorégions de niveau 1	Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits
8	CÉVENNES	Cas général		0,93333-0,80000-0,53333-0,33333			
		A-her2 n°70			0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		
16	CORSE	A-her2 n°22		0,92307-0,76923-0,46153-0,23076		0,91666-0,75000-0,50000-0,25000	
		B-her2 n°88					
19	GRANDS CAUSSES	Cas général				0,92857-0,78571-0,57142-0,28571	
		Exogène de l'HER 8		0,94117-0,82352-0,52940-0,29411			
11	CAUSSES AQUITAINS	Cas général				0,93333-0,80000-0,53333-0,33333	
		Exogène de l'HER 3 et/ou 21	#	0,94117-0,82352-0,52940-0,29411			
14	CÔTEAUX AQUITAINS	Exogène des HER 3, 8, 11 ou 19	#	0,94117-0,82352-0,52940-0,29411			
		Exogène de l'HER 3 ou 8					
		Cas général		0,93333-0,80000-0,53333-0,33333			
		Exogène de l'HER 1	#	#	0,93750-0,81250-0,56250-0,31250		
13	LANDES	Cas général			0,93333-0,80000-0,53333-0,33333		
1	PYRENEES	Cas général		#	0,93750-0,81250-0,56250-0,31250		
12	ARMORICAIN	A-Centre-Sud		#	0,93333-0,80000-0,53333-0,33333		
		B-Ouest-Nord Est			0,93750-0,81250-0,56250-0,31250		
TTGL	LA LOIRE	Cas général	#				
9	TABLES CALCAIRES	A-her2 n°57			0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		
		Cas général	#	0,92857-0,78571-0,57142-0,28571		0,93750-0,81250-0,56250-0,31250	
		Exogène de l'HER 10		0,93750-0,81250-0,56250-0,31250			
		Exogène de l'HER 21	#		0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		
10	CÔTES CALCAIRES EST	Exogène de l'HER 21		#	0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		

Valeurs inférieures des limites de classe par type* pour l'EQR-équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et de l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds		Catégories de tailles de cours d'eau				
		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits
Hydroécorégions de niveau 1						
10	CÔTES CALCAIRES EST	Cas général	#	0,93750-0,81250-0,56250-0,31250		0,93333-0,80000-0,53333-0,33333
		Exogène de l'HER 4		#	0,93333-0,80000-0,53333-0,33333	
4	VOSGES	Cas général		0,93333-0,80000-0,53333-0,33333		
22	ARDENNES	Exogène de l'HER 10	#			
		Cas général		0,94444-0,77777-0,55555-0,27777		
18	ALSACE	Cas général			0,93333-0,80000-0,53333-0,33333	
		Exogène de l'HER 4		#	0,93333-0,80000-0,53333-0,33333	

* Lorsque plusieurs types d'une même HER sont concernés par une valeur de référence et des valeurs seuils de limites de classes identiques, alors ces types sont regroupés, par soucis de simplification, au sein d'une même cellule dans le présent tableau.

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre.

Les valeurs des indices de ce tableau ont pris en compte la décision de la commission du 12 février 2018.

: absence de référence.

En grisé : type inexistant

Valeurs de références, par type de cours d'eau, pour l'indice équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds

Valeur de référence par type* pour l'indice équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds		Catégories de tailles de cours d'eau					
		Hydroécorégions de niveau 1	Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits
20	DEPÔTS ARGILO SABLEUX	Cas général		16			
		Exogène de l'HER 9		15			
		Exogène de l'HER 21					
21	MASSIF CENTRAL NORD	Cas général		#	19	19	
3	MASSIF CENTRAL SUD	Cas général		#	19		
		Exogène de l'HER 19			18		
		Exogène de l'HER 8			19		
17	DÉPRESSIONS SÉDIMENTAIRES	Cas général			16		
		Exogène de l'HER 3 ou 21	#	#	19	19	
15	PLAINE SAÔNE	Exogène de l'HER 3 ou 21			19		
		Exogène de l'HER 5		#	15		
		Cas général	#		15	15	15
		Exogène de l'HER 4	#				
5	JURA / PRÉ-ALPES DU NORD	Cas général		#	15		
		Exogène de l'HER 2	#	15			
TTGA	FLEUVES ALPINS	Cas général	#				
2	ALPES INTERNES	Cas général		15			
7	PRÉ-ALPES DU SUD	Cas général		15			
		Exogène de l'HER 2	#	14			
6	MÉDITERRANÉE	Exogène de l'HER 2 ou 7		16			
		Exogène de l'HER 7		16			
		Exogène de l'HER 8		16			
		Exogène de l'HER 1	#	17			
		Cas général		17		17	17
8	CÉVENNES	Cas général		16			
		A-her2 n°70			15	15	15

Valeur de référence par type* pour l'indice équivalent phase (A+B) de l'HER 9 A-her2 n°57 et l'indice MGCE 12 prélèvements des cours d'eau profonds		Catégories de tailles de cours d'eau					
		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
Hydroécorégions de niveau 1							
16	CORSE	A-her2 n°22		14		13	
		B-her2 n°88					
19	GRANDS CAUSSES	Cas général				15	
		Exogène de l'HER 8		18			
11	CAUSSES AQUITAINS	Cas général				16	16
		Exogène de l'HER 3 et/ou 21	#	18			
14	CÔTEAUX AQUITAINS	Exogène des HER 3, 8, 11 ou 19	#	18			
		Exogène de l'HER 3 ou 8					
		Cas général		16			
		Exogène de l'HER 1	#	#	17		
13	LANDES	Cas général			16		
1	PYRENEES	Cas général		#	17		
12	ARMORICAIN	A-Centre-Sud		#	16		
		B-Ouest-Nord Est		#	17		
TTGL	LA LOIRE	Cas général	#				
9	TABLES CALCAIRES	A-her2 n°57			15		
		Cas général	#	15		17	
		Exogène de l'HER 10		17			
		Exogène de l'HER 21	#	#	19		
10	COTES CALCAIRES EST	Exogène de l'HER 21					
		Cas général	#	17		16	
		Exogène de l'HER 4		#	16		
4	VOSGES	Cas général			16		
22	ARDENNES	Exogène de l'HER 10	#				
		Cas général		19			
18	ALSACE	Cas général			16		
		Exogène de l'HER 4		#	16		

* Lorsque plusieurs types d'une même HER sont concernés par une valeur de référence et des valeurs seuils de limites de classes identiques, alors ces types sont regroupés, par soucis de simplification, au sein d'une même cellule dans le présent tableau.

: absence de référence.

En grisé : type inexistant.

Indice pour l'ichtyofaune : indice poisson de rivière (code Sandre : 7036)

La transformation en EQR des valeurs de limites de classes pour l'IPR présentant des difficultés, il a été décidé de maintenir ces valeurs-seuils en note d'indice. Pour la classification de l'état biologique de l'élément de qualité ichtyofaune, la note d'indice calculée sur un prélèvement est à comparer directement aux valeurs inférieures des limites de classes figurant dans le tableau ci-après.

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées par type de cours d'eau pour l'IPR

IPR		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Catégories de tailles de cours d'eau					
			Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits	
Hydroécocorégions de niveau 1								
20	DÉPÔTS ARGILO SABLEUX	Cas général		5-16*-25-36				
		Exogène de l'HER 9		5-16*-25-36				
		Exogène de l'HER 21		5-16*-25-36				
21	MASSIF CENTRAL NORD	Cas général		5-16*-25-36			5-16*-25-36	
3	MASSIF CENTRAL SUD	Cas général		5-16*-25-36			5-16*-25-36	
		Exogène de l'HER 19			5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 8			5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 19 ou 8		5-16*-25-36				
17	DÉPRESSIONS SÉDIMENTAIRES	Cas général			5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 3 ou 21	5-16-25-36	5-16*-25-36				
15	PLAINE SAÔNE	Exogène de l'HER 3 ou 21			5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 5		5-16*-25-36				
		Cas général	5-16-25-36		5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 4	5-16-25-36					
5	JURA / PRE-ALPES DU NORD	Cas général		5-16*-25-36				
		Exogène de l'HER 2	5-16-25-36	5-16*-25-36				
TTGA	FLEUVES ALPINS	Cas général						

IPR		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Catégories de tailles de cours d'eau				
			Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
Hydroécocorégions de niveau 1							
2	ALPES INTERNES	Cas général		5-16*-25-36			
7	PRÉ-ALPES DU SUD	Cas général		5-16*-25-36			5-16*-25-36
		Exogène de l'HER 2	5-16-25-36	5-16*-25-36			
6	MÉDITERRANÉE	Exogène de l'HER 2 ou 7	5-16-25-36	5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 7		5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 8	5-16-25-36				
		Exogène de l'HER 1					
		Cas général		5-16*-25-36			
8	CÉVENNES	Cas général		5-16*-25-36			
		A-her2 n°70			5-16*-25-36		
16	CORSE	A-her2 n°22		#			
		B-her2 n°88					
19	GRANDS CAUSSES	Cas général				5-16*-25-36	
		Exogène de l'HER 8		5-16*-25-36			
11	CAUSSES AQUITAINS	Cas général				5-16*-25-36	5-16*-25-36
		Exogène de l'HER 3 et/ou 21	5-16-25-36	5-16*-25-36			
14	CÔTEAUX AQUITAINS	Exogène des HER 3, 8, 11 ou 19	5-16-25-36	5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 3 ou 8		5-16*-25-36			
		Cas général					5-16*-25-36
		Exogène de l'HER 1	5-16-25-36	5-16*-25-36			
13	LANDES	Cas général			5-16*-25-36		5-16*-25-36
1	PYRÉNÉES	Cas général		5-16*-25-36			5-16*-25-36
12	ARMORICAIN	A-Centre-Sud		5-16*-25-36			5-16*-25-36
		B-Ouest-Nord Est		5-16*-25-36			5-16*-25-36

IPR		Cas général, cours d'eau exogène de l'HER de niveau 1 indiquée ou HER de niveau 2	Catégories de tailles de cours d'eau				
			Très Grands	Grands	Moyens	Petits	Très Petits
Hydroécorégions de niveau 1							
TTGL	LA LOIRE	Cas général	5-16-25-36				
9	TABLES CALCAIRES	A-her2 n°57			5-16*-25-36		
		Cas général	5-16-25-36	5-16*-25-36			5-16*-25-36
		Exogène de l'HER 10		5-16*-25-36			
		Exogène de l'HER 21	5-16-25-36				
10	CÔTES CALCAIRES EST	Exogène de l'HER 21		5-16*-25-36			
		Cas général	5-16-25-36			5-16*-25-36	
		Exogène de l'HER 4			5-16*-25-36		
4	VOSGES	Cas général		5-16*-25-36			
22	ARDENNES	Exogène de l'HER 10	5-16-25-36				
		Cas général		5-16*-25-36			
18	ALSACE	Cas général			5-16*-25-36		
		Exogène de l'HER 4		5-16*-25-36			

a-b-c-d : a = limite très bon état / bon état, b = limite bon état / état moyen, c = limite état moyen / état médiocre, d = limite état médiocre / état mauvais

Les limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante :

- pour l'état très bon : [0 ; a (valeur de la limite incluse)] ;
- pour les états bon, moyen et médiocre :] respectivement a, b, c (valeur de la limite exclue) ; respectivement b, c, d (valeur de la limite incluse)] ;
- pour l'état mauvais : > d (valeur de la limite exclue).

Les valeurs de l'IPR figurant dans ce tableau ont pris en compte la décision de la commission du 12 février 2018 relative à l'inter-étalonnage.

En grisé : type inexistant

En gris clair : Bien que potentiellement pertinents partout, le résultat de l'évaluation pourra être à valider à dire d'expert pour certaines stations de ces types au regard des limites d'application de l'indice consignées dans la notice IPR (CSP, avril 2006). Ces limites concernent notamment les stations de très grands cours d'eau ou celles situées en zones apiscicoles ou assimilables

: l'IPR ne s'applique pas à la Corse.

16* : dans les cas où l'altitude du site d'évaluation est supérieure ou égale à 500 m, la valeur de 14,5 doit être utilisée au lieu de 16

ANNEXE 2 : ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU - INDICES BIOLOGIQUES POUR LES ANTILLES (GUADELOUPE/MARTINIQUE)

Indice pour le phytoplancton

Le suivi de l'élément de qualité phytoplancton est considéré comme pertinent uniquement pour les très grands cours d'eau. En l'absence de tels cours d'eau aux Antilles, aucun indice phytoplancton ne sera développé pour l'évaluation de l'état.

Indice pour les macrophytes

Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, aucun indice biologique macrophytes n'a été développé, considérant que cet élément de qualité biologique n'est pas pertinent dans ces départements.

- Les résultats des observations menées sur un panel complet de sites représentatifs des réseaux de surveillance mis en place ou, plus généralement, de l'ensemble des types de cours d'eau de chacun de ces territoires, ont permis de confirmer plusieurs éléments :
- Dans les départements des Antilles, la topographie abrupte et la superficie généralement faible des bassins-versant, associée à des épisodes pluviaux souvent violents, génèrent des régimes hydrologiques très contrastés sur un cycle annuel, avec des périodes d'assez plus ou moins complet alternant avec des écoulements à très haute énergie provoquant un remaniement important et fréquent des substrats. Ces caractéristiques sont très défavorables à l'implantation et au maintien de peuplements de macrophytes en équilibre avec les pressions de type anthropique.
- Le couvert forestier très dense, présent sur de grandes étendues de ces territoires, ne permet souvent qu'un éclaircissement très faible des petits cours d'eau qui forment la majeure partie du réseau hydrographique. Ceci limite l'implantation de peuplements macrophytiques à de rares formes, le plus souvent hélophytiques. Dans ces conditions naturelles limitantes, ces peuplements traduisent principalement ces conditions particulières, et non un gradient de réponse aux pressions anthropiques.
- De même, la nature géochimique des eaux, en relation avec l'origine volcanique des roches, génère des systèmes aquatiques naturellement oligotrophes à ultra-oligotrophes, pour la plupart des types de cours d'eau. La végétation y est donc naturellement pauvre. Localement, l'hydrogéochimie peut parfois, au contraire, être très spécifique, et apporter une minéralité excessive à l'eau (sources thermales à la Guadeloupe, par exemple). Les peuplements d'algues peuvent alors être abondants, mais ne représentent que ces conditions naturellement très particulières.
- La superficie assez faible de ces territoires et le contraste entre occupation du sol des zones centrales et de la bande littorale rendent difficiles l'obtention d'un gradient de pression associé à un nombre suffisant de sites de mesures, conditions nécessaires au développement d'un indicateur basé sur une approche statistique des relations entre pressions et impacts, comme le stipulent les critères de conformité méthodologique DCE.
- De plus, les gradients de pression anthropiques sont très resserrés, entre les zones amont et médianes des bassins, généralement pas ou très peu impactées (très forts reliefs), et les zones distales côtières, où l'impact est parfois très fort mais très localisé au tout dernier tronçon des cours d'eau. Cette configuration assez généralisée est défavorable à l'obtention d'un gradient de calage d'un indicateur biologique.

- Quelques secteurs subissent des pressions modérées (agriculture, habitat diffus) et montrent des peuplements macrophytiques susceptibles de supporter une approche de bioindication, comme sur la partie sud de la Martinique ou le nord-est de Basse-Terre en Guadeloupe, mais il s'agit très principalement de peuplements d'algues ou d'hélophytes rivulaires, difficiles à utiliser seuls en tant que bioindicateur macrophytes.

Indice pour le phytobenthos : indice diatomique antillais (code Sandre 8053)

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : indice diatomique antillais (IDA)).

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée}) / (\text{note de référence du type})$$

Valeurs inférieures des limites de classe, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IDA

Diatomées des cours d'eau des Antilles (EQR-IDA)			Catégories de taille de cours d'eau				
Bassin	Hydroécorégions		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Guadeloupe	1	Basse-Terre plaine nord-est			0,975 - 0,915 - 0,60 - 0,34		
	3	Basse-Terre volcans					
Martinique	1	Pitons du Nord			0,925 - 0,80 - 0,61 - 0,38		
	2	Mornes du Sud et plaine du Lamentin*					

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

En grisé : type inexistant

() Sauf Lézarde de Martinique, cours d'eau issu de l'HER Pitons du Nord qui traverse ensuite rapidement la Plaine du Lamentin. Ce cours d'eau est à évaluer sur tout son cours sur la grille Pitons du Nord*

Valeurs de référence par type de cours d'eau pour l'IDA

Diatomées des cours d'eau des Antilles (IDA)			Catégories de taille de cours d'eau				
Bassin	Hydroécorégions		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Guadeloupe	1	Basse-Terre plaine nord-est			19,63		
	3	Basse-Terre volcans					
Martinique	1	Pitons du Nord			18		
	2	Mornes du Sud et plaine du Lamentin*					

En grisé : type inexistant

(*) Sauf Lézarde de Martinique, cours d'eau issu de l'HER Pitons du Nord qui traverse ensuite rapidement la Plaine du Lamentin. Ce cours d'eau est à évaluer sur tout son cours sur la grille Pitons du Nord

Indice pour la faune benthique invertébré : indice biologique macro-invertébrés Antilles (code Sandre 8040)

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : l'indice biologique macro-invertébrés Antilles (IBMA)).

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IBMA

Invertébrés des cours d'eau des Antilles (EQR-IBMA)			Catégories de taille de cours d'eau					
Bassin	Hydroécorégions		Cas général, cours d'eau exogènes de l'HER	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Guadeloupe	1	Basse-Terre plaine nord-est (plaine humide)	Cas général			0,7324 - 0,6003 - 0,4866 - 0,3537		
	3	Basse-Terre volcans	Cas général					
Martinique	1	Pitons du Nord	Cas général			0,7324 - 0,5000 - 0,3500 - 0,2900		
			ME « Monsieur »					
	2	Mornes du Sud (collines)	Cas général			0,7324 - 0,6003 - 0,4866 - 0,3537		
			Aval de la ME « Rivière du Galion »					
3	Plaine du Lamentin	Cas général						

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre. En grisé : type inexistant

Pour la Martinique :

La plupart des stations de surveillance des ME de l'HER « Mornes du sud » correspondent au biotype M6, tel que défini dans le guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'IBMA (Bernadet et al. 2019). Les valeurs-seuils du biotype M6 y sont donc à appliquer. Fait exception la partie aval de la ME « Rivière du Galion », située dans l'HER « Mornes du sud », mais exogène de l'HER « Pitons du nord », qui répond du biotype M5.

Les stations de l'HER « Plaine du Lamentin » appartiennent au biotype M5 ; les valeurs-seuils de ce biotype sont donc à appliquer aux ME de cette HER.

Les stations de l'HER « Pitons du Nord » se répartissent entre les biotypes M4, M5 et M6. Les valeurs-seuils communes aux biotypes M4 et M5 sont à appliquer à la majorité des ME, à l'exception de la ME « Monsieur », mais pour laquelle par ailleurs, il n'y a pas de station RCS.

Pour la Guadeloupe :

Les stations de Guadeloupe des HER correspondent aux biotypes G1, G2 et G3, qui tous présentent les mêmes valeurs-seuils. Il n'est donc pas nécessaire de distinguer les masses d'eau pour l'évaluation. L'HER 2 « Iles sèches » ne présente pas de masses d'eau suivies au titre de l'EQB « invertébrés benthiques ».

Indice pour l'ichtyofaune

Aucun indice biologique ichtyofaune n'est actuellement disponible pour les Antilles. Le suivi de l'élément de qualité Icthyofaune est considéré comme pertinent et un indice biologique sera développé pour le 3^e cycle DCE. Cet outil devrait permettre de prendre en compte dans l'évaluation de l'état les pressions relatives au prélèvement en eau et sur la continuité biologique en général.

ANNEXE 3 : ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU - INDICES BIOLOGIQUES POUR LA GUYANE

Indice pour le phytoplancton

En Guyane, le suivi de l'élément de qualité phytoplancton est considéré comme pertinent uniquement pour certains très grands cours d'eau. L'objectif est de développer un indice biologique pour le prochain cycle DCE.

Indice pour les macrophytes

Pour le département de la Guyane aucun indice biologique macrophytes n'a été développé, considérant que cet élément de qualité biologique n'est pas pertinent dans ce département.

Les résultats des observations, menées sur un panel complet de sites représentatifs des réseaux de surveillance mis en place ou, plus généralement, de l'ensemble des types de cours d'eau de ce territoire, ont permis de confirmer plusieurs éléments :

- Le couvert forestier très dense, présent sur de grandes étendues de ces territoires, ne permet qu'un éclairage extrêmement faible des petits cours d'eau (les criques) qui forment la majeure partie du réseau hydrographique. Ceci limite l'implantation de peuplements macrophytiques à de rares formes, présentes uniquement lorsqu'une trouée naturelle ou artificielle (abords d'une piste ou d'un abattis) dans la canopée permet un éclairage suffisant du sol. Dans ces conditions naturelles limitantes, ces peuplements traduisent principalement ces conditions particulières, et non un gradient de réponse aux pressions anthropiques.
- Les peuplements de macrophytes des grands cours d'eau sont localisés à certaines zones de sauts, et très spécialisés (composés en quasi exclusivité de Podostémacées, dont la taxinomie et l'écologie sont encore largement méconnues). Si, localement, il est probable que les peuplements en place soient indicateurs de conditions particulières, cette très faible diversité associée à une méconnaissance de la flore aquatique guyanaise ne permet pas d'envisager un indicateur à l'échelle de l'ensemble du territoire.
- La nature géochimique des eaux, en relation avec l'encaissant granitique (bouclier guyanais) génère des systèmes aquatiques extrêmement peu minéralisés, naturellement oligotrophes à ultra-oligotrophes pour la plupart des types de cours d'eau. La végétation macrophytique y est donc naturellement très pauvre, et même souvent totalement absente.
- La typologie très homogène de ce territoire et le fait que la très grande majorité du territoire guyanais n'est pas ou très peu impacté par les activités humaines rendent difficiles l'obtention d'un gradient de pression associé à un nombre suffisant de sites de mesures, conditions nécessaires au développement d'un indicateur basé sur une approche statistique des relations entre pressions et impacts, comme le stipulent les critères de conformité méthodologique DCE.
- Un très fort resserrement du gradient de pression anthropique s'observe, bien que le relief soit peu marqué, entre la couverture forestière et la bande côtière, dont les cours d'eau sont soumis aux marées et n'entrent donc pas dans les critères de pertinence macrophytes de cours d'eau. Cette configuration assez généralisée ne permet pas d'obtenir un gradient de calage d'un indicateur macrophytes.

- Quelques secteurs pourraient présenter des pressions modérées (agriculture, habitat diffus) et des peuplements macrophytiques supportant une approche de bioindication, comme sur quelques courts tronçons de raccordement à la bande côtière guyanaise, mais il s'agit surtout de peuplements d'algues, difficiles à utiliser seuls en tant que bioindicateur macrophytes. Les zones où la pression est localement forte (tronçons soumis à des rejets domestiques non ou peu traités) ont montré des peuplements modestes, surtout composés d'algues, dont l'utilisation en bioindication macrophytes est a priori non pertinente.

Les caractéristiques régissant le fonctionnement et la typologie des cours d'eau de Guyane limitent fortement la faisabilité de mise au point d'un indicateur d'état écologique tels que ceux qui ont été développés en métropole à partir des peuplements macrophytiques. La pertinence de cet élément de qualité biologique dans ce territoire n'est donc pas assurée.

Indice pour le phytobenthos : indice de polluo-sensibilité spécifique (IPS)

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée}) / (\text{note de référence du type})$$

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IPS

Diatomées des cours d'eau de Guyane (EQR-IPS)		Catégories de taille de cours d'eau				
		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
1	Plaine littorale	0,92 - 0,78 - 0,58 - 0,32*		0,97 - 0,85 - 0,63 - 0,35		
3	Bouclier guyanais	0,92 - 0,78 - 0,58 - 0,32				
1	Exogènes de l'HER 2					

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

** : les très grands cours d'eau traversant l'hydroécocorégion plaine littorale sont considérés comme exogènes de l'hydroécocorégion bouclier Guyanais. En conséquence, la grille de l'HER bouclier guyanais s'applique.*

Valeurs de référence par type de cours d'eau pour l'IPS

Diatomées des cours d'eau de Guyane (IPS)		Catégories de taille de cours d'eau				
		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
1	Plaine littorale	17,4*	18			
3	Bouclier guyanais	17,4				
1	Exogènes de l'HER 2					

** : les très grands cours d'eau traversant l'hydroécocorégion plaine littorale sont considérés comme exogène de l'hydroécocorégion bouclier guyanais. En conséquence, la grille de l'HER bouclier guyanais s'applique.*

Indice pour la faune benthique invertébrée : score moyen des éphéméroptères de Guyane

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : score moyen des éphéméroptères de Guyane).

Valeurs inférieures des limites des classes, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour le SMEG

Invertébrés des cours d'eau de Guyane (EQR-SMEG)		Catégories de taille de cours d'eau				
		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
1	Plaine littorale					
2	Bouclier guyanais	≥ 4,1 – 3,08 – 2,05 – 1,03	≥ 4,1 – 3,08 – 2,05 – 1,03	≥ 4,1 – 3,08 – 2,05 – 1,03	≥ 4,1 – 3,08 – 2,05 – 1,03	≥ 4,1 – 3,08 – 2,05 – 1,03

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

En grisé : absence de référence définie pour l'HER plaine littorale

Valeurs de référence par type de cours d'eau pour le SMEG

Diatomées des cours d'eau de Guyane (SMEG)		Catégories de taille de cours d'eau				
		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
1	Plaine littorale					
2	Bouclier guyanais	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63

En grisé : absence de référence définie pour l'HER plaine littorale

Indice pour l'ichtyofaune : indice poissons Guyane global

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : l'indice poissons Guyane global (IPG-global))

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IPG global

Poissons des cours d'eau de Guyane (EQR-IPG-global)		Catégories de taille de cours d'eau				
		Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
1	Plaine littorale	0,98 – 0,74 – 0,49 – 0,24			Indice non applicable	Indice non applicable
2	Bouclier guyanais				Indice non applicable	Indice non applicable

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

ANNEXE 4 : ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU - INDICES BIOLOGIQUES POUR LA RÉUNION

Indice pour le phytoplancton

Le suivi de l'élément de qualité phytoplancton est considéré comme pertinent uniquement pour les très grands cours d'eau. En l'absence d'une typologie de cours d'eau à la Réunion, aucun indice phytoplancton ne sera développé pour l'évaluation de l'état.

Indice pour les macrophytes

Pour le département de la Réunion aucun indice biologique macrophytes n'a été développé, considérant que cet élément de qualité biologique n'est pas pertinent dans ce département.

Les résultats des observations menées sur un panel complet de sites représentatifs des réseaux de surveillance mis en place ou, plus généralement, de l'ensemble des types de cours d'eau de chacun de ces territoires, ont permis de confirmer plusieurs éléments :

- Dans les RUP insulaires (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte), la topographie abrupte et la superficie généralement faible des bassins-versant, associée à des épisodes pluviaux souvent violents, génèrent des régimes hydrologiques très contrastés sur un cycle annuel, avec des périodes de basses eaux ou d'assec plus ou moins complet alternant avec des écoulements à très haute énergie provoquant un remaniement important et fréquent des substrats. Ces caractéristiques sont très défavorables à l'implantation et au maintien de peuplements de macrophytes en équilibre avec les pressions de type anthropique.
- La nature géochimique des eaux, en relation avec l'origine volcanique des roches, génère des systèmes aquatiques naturellement oligotrophes à ultra-oligotrophes, pour la plupart des cours d'eau. La végétation y est donc naturellement très peu diversifiée. Localement, l'hydrogéochimie peut parfois, au contraire, être très spécifique, et apporter une minéralité excessive à l'eau (sources thermales, par exemple). Les peuplements d'algues peuvent alors être abondants, mais ne représentent que ces conditions naturellement très particulières.
- Les gradients de pression anthropiques sont très resserrés, entre les zones amont et médianes des bassins, généralement peu ou très peu impactées (très forts reliefs), et les zones distales côtières, où l'impact est parfois très fort mais très localisé au tout dernier tronçon des cours d'eau. Cette configuration assez généralisée est défavorable à l'obtention d'un gradient de calage d'un indicateur biologique.
- Quelques secteurs subissent des pressions modérées (agriculture, habitat diffus) et montrent des peuplements macrophytiques susceptibles de supporter une approche de bioindication, mais il s'agit très principalement de peuplements d'algues ou d'hélophytes rivulaires, difficiles à utiliser seuls en tant que bioindicateur macrophytes.
- Les quelques peuplements abondants en cours d'eau sont observés sur des zones très limitées, dans de courts tronçons de raccordement à la mer, et sont le fait d'espèces invasives opportunistes et proliférantes (Cypéracées, Jacynthe d'eau, Laitue d'eau), donc peu indicatrices de pressions anthropiques chimiques ou morphologiques.

Les caractéristiques régissant le fonctionnement et la typologie des cours d'eau de la Réunion limitent fortement la faisabilité de mise au point d'un indicateur d'état écologique tels que ceux qui ont été développés en métropole à partir des peuplements macrophytiques. La pertinence de cet élément de qualité biologique dans ce territoire n'est donc pas assurée.

Indice pour le phytobenthos : indice diatomique Réunion (IDR)

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : l'indice diatomique Réunion (IDR))

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée}) / (\text{note de référence du type})$$

Valeurs inférieures des limites des classes, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IDR

Diatomées des cours d'eau de la Réunion (EQR-IDR)	Catégories de taille de cours d'eau				
	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Hydroécorégions					
Zone naturelle Ouest (de la Rivière des Pluies au Nord à la Rivière des Remparts au Sud)			0,980 - 0,940 - 0,760 - 0,420		
Zone naturelle Est (de la Rivière Sainte - Suzanne au Nord à la Rivière de l'Est au Sud)			0,9875 - 0,935 - 0,740 - 0,400		

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

En grisé : type inexistant

Valeurs de référence par type de cours d'eau pour l'IDR

Diatomées des cours d'eau de la Réunion (IDR)	Catégories de taille de cours d'eau				
	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Hydroécorégions					
Zone naturelle Ouest (de la Rivière des Pluies au Nord à la Rivière des Remparts au Sud)			19,7		
Zone naturelle Est (de la Rivière Sainte - Suzanne au Nord à la Rivière de l'Est au Sud)			19,82		

En grisé : type inexistant

Indice pour la faune benthique invertébrée : indice Réunion macro-invertébrés

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : l'indice Réunion macro-invertébrés)

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée}) / (\text{note de référence du type})$$

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IRM

Invertébrés des cours d'eau de la Réunion (EQR-IRM)	Catégories de taille de cours d'eau					
	Hydroécorégions	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Cirques au vent				1 - 0,8 - 0,6 - 0,4	1 - 0,8 - 0,6 - 0,4	
Cirques sous le vent				1 - 0,8 - 0,6 - 0,4	1 - 0,8 - 0,6 - 0,4	
Versants au vent				1 - 0,8 - 0,6 - 0,4		
Versants sous le vent				#		

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

: Absence de références

En grisé : type inexistant

Valeurs de référence par type de cours d'eau pour l'IRM

Invertébrés des cours d'eau de la Réunion (IRM)	Catégories de taille de cours d'eau					
	Hydroécorégions	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Cirques au vent				40	40	
Cirques sous le vent				40	40	
Versants au vent				40		
Versants sous le vent				#		

: Absence de références (situation provisoire)

En grisé : type inexistant

Indice pour l'ichtyofaune : indice Réunion poissons

(Guide méthodologique pour la mise en œuvre d'indices biologiques en outre-mer : indice Réunion poissons (IRP))

La note en EQR se calcule comme suit :

$$\text{Note en EQR} = (\text{note observée}) / (\text{note de référence du type})$$

Valeurs inférieures des limites des classes d'état, exprimées en EQR, par type de cours d'eau pour l'IRP

Poissons des cours d'eau de la Réunion (EQR-IRP)	Catégories de taille de cours d'eau				
	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Hydroécorégions					
Cirques au vent			1 ->0,8 - 0,6 - 0,4	1 ->0,8 - 0,6 - 0,4	
Cirques sous le vent			1 ->0,8 - 0,6 - 0,4	1 ->0,8 - 0,6 - 0,4	
Versants au vent			1 ->0,8 - 0,6 - 0,4		
Versants sous le vent			1 ->0,8 - 0,6 - 0,4		

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre

En grisé : type inexistant

Valeurs de référence par type de cours d'eau pour l'IRP

Poissons des cours d'eau de la Réunion (IRP)	Catégories de taille de cours d'eau				
	Très grands	Grands	Moyens	Petits	Très petits
Hydroécorégions					
Cirques au vent			15	15	
Cirques sous le vent			15	15	
Versants au vent			15		
Versants sous le vent			15		

En grisé : type inexistant

ANNEXE 5 : ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU - PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

1) Table générale

Valeurs des limites des classes d'état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d'eau

PARAMÈTRES PAR ÉLÉMENT DE QUALITÉ (unités)	CODE	LIMITES DES CLASSES D'ÉTAT			
		Très bon / Bon	Bon / Moyen	Moyen / Médiocre	Médiocre / Mauvais
Bilan de l'oxygène ¹					
Oxygène dissous (mg O ₂ /l)	1311	8	6	4	3
Taux de saturation en O ₂ dissous (%)	1312	90	70	50	30
DBO5 (mg O ₂ /l)	1313	3	6	10	25
Carbone organique dissous (mg C/l)	1841	5	7	10	15
Température ²					
Eaux salmonicoles	1301	20	21,5	25	28
Eaux cyprinicoles		24	25,5	27	28
Nutriments					
PO ₄ ³⁻ (mg PO ₄ ³⁻ /l)	1433	0,1	0,5	1	2
Phosphore total (mg P/l)	1350	0,05	0,2	0,5	1
NH ₄ ⁺ (mg NH ₄ ⁺ /l)	1335	0,1	0,5	2	5
NO ₂ ⁻ (mg NO ₂ ⁻ /l)	1339	0,1	0,3	0,5	1
NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /l)	1340	10	50	*	*
Acidification ¹					
pH minimum	1302	6,5	6	5,5	4,5
pH maximum		8,2	9	9,5	10
Salinité					
Conductivité	1303	*	*	*	*
Chlorures	1337	*	*	*	*
Sulfates	1338	*	*	*	*

¹ Acidification : en d'autres termes, à titre d'exemple, pour la classe bon état, le pH min est compris entre 6,0 et 6,5 ; le pH max entre 9,0 et 8,2.

² Pour l'élément de qualité température, un paramètre supplémentaire intermédiaire non référencé ici est également utilisé. Pour ce dernier, il est recommandé d'utiliser les limites de classe du paramètre salmonicoles.

* : les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des seuils fiables pour cette limite.

Les limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante : [valeur de la limite supérieure (exclue), valeur de la limite inférieure (incluse)].

Les limites inférieures du très bon état sont à considérer à titre indicatif.

2) Cas particuliers

Les tableaux ci-dessous indiquent les adaptations à apporter dans certains cas particuliers par rapport à la table générale.

Cours d'eau naturellement pauvres en oxygène

PARAMÈTRES	LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ÉTAT
Bilan de l'oxygène	
Oxygène dissous (mg O ₂ .l ⁻¹)]7,5 - 6]
Taux de saturation en O ₂ dissous (%)]80 - 65]

Cours d'eau naturellement riches en matières organiques

PARAMÈTRES	LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ÉTAT
Bilan de l'oxygène	
Carbone organique dissous (mg C.l ⁻¹)]8-9]

Cours d'eau naturellement froids (température de l'eau inférieure à 14 °C) et peu alcalins (pH max inférieur à 8,5 unité pH) moins sensibles aux teneurs en NH₄⁺ : (HER 2 Alpes internes : cours d'eau très petits à moyens

PARAMÈTRES	LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ÉTAT
Nutriments	
NH ₄ ⁺ (mg NH ₄ ⁺ .l ⁻¹)]0,1 - 1]

Cours d'eau naturellement acides

PARAMÈTRES	LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ÉTAT
Acidification	
pH minimum]6 - 5,8]
pH maximal]8,2 - 9]

Cours d'eau des zones de tourbières

Non prise en compte du paramètre carbone organique.

Cours d'eau de température naturellement élevée (HER 6 : Méditerranée ainsi que l'ensemble des cours d'eau des RUP)

Non prise en compte du paramètre température car les températures (estivales pour l'HER 6) sont naturellement élevées du fait des influences climatiques.

L'ensemble des valeurs-seuils mentionnées ci-dessus correspond à ce qu'il est possible de déterminer aujourd'hui compte-tenu des connaissances disponibles. Ces valeurs seront ultérieurement adaptées, notamment par type ou groupe de types de cours d'eau, conformément aux exigences de la DCE. Pour mémoire, les limites des classes très bon/bon et bon/moyen sont celles mentionnées dans le tableau 5 de la circulaire DCE 2005/12 relative au bon état. Les limites des classes inférieures sont issues du SEQ eau V1.

Annexe 6 : État écologique des cours d'eau et plans d'eau - Polluants spécifiques et leurs normes de qualité environnementale

Il a été proposé en GT Substances de ne pas utiliser la définition du très bon état pour les polluants spécifiques de l'état écologique fournie par la DCE, car cette définition est imprécise et n'est en pratique pas appliquée. En revanche, les conditions sur l'élément de qualité PSEE pour que l'état physico-chimique soit très bon ont été redéfinies (cf. section 2.3.1).

	Très bon état	Bon état	État moyen
Polluants synthétiques spécifiques	N/A	Concentrations ne dépassant pas les normes précisées ci-après	Conditions permettant d'atteindre l'état moyen pour les éléments de qualité biologique.
Polluants non synthétiques spécifiques	N/A	Concentrations ne dépassant pas les normes précisées ci-après	Conditions permettant d'atteindre l'état moyen pour les éléments de qualité biologique.

1. Polluants spécifiques non synthétiques

Fraction à analyser : eau filtrée²⁸

Code Sandre	Nom substance	NQE exprimée en concentration moyenne annuelle - eaux douces de surface [µg/l]
1383	Zinc	7,8
1369	Arsenic	0,83
1392	Cuivre	1
1389	Chrome	3,4

Comme pour les paramètres de l'état chimique, les normes applicables aux métaux peuvent être corrigées du fond géochimique et de la biodisponibilité.

²⁸ Filtration à travers un filtre de 0,45 micromètres ou par tout autre traitement préliminaire équivalent

2. Polluants spécifiques synthétiques

Fraction à analyser : eau brute

Code Sandre	Nom substance	Bassins pour lesquelles la norme s'applique											NQE exprimée en concentration moyenne annuelle – eaux douces de surface [$\mu\text{g/l}$]	
		Adour Garonne	Artois-Picardie	Loire-Bretagne	Rhin-Meuse	Rhône-Méditerranée	Corse	Seine-Normandie	Guadeloupe	Guyane	Martinique	Mayotte		Réunion
1136	Chlortoluron	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,1
1670	Métazachlore	X	X	X	X	X	X	X						0,019
1105	Aminotriazole	X	X	X	X	X	X	X						0,08
1882	Nicosulfuron	X		X	X	X	X	X						0,035
1667	Oxadiazon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,09
1907	AMPA	X	X	X	X	X	X	X			X			452
1506	Glyphosate	X	X	X	X	X	X	X			X			28
1113	Bentazone	X												70
1212	2,4 MCPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,5
1814	Diflufenicanil		X	X	X	X	X	X						0,01
1359	Cyprodinil		X			X	X							0,026
1877	Imidaclopride		X					X						0,2
1206	Iprodione		X											0,35
1141	2,4D		X	X	X			X	X	X	X	X	X	2,2
1951	Azoxystrobine		X											0,95
1278	Toluène			X										74
1847	Phosphate de tributyle		X			X	X							82
1584	Biphényle							X						3,3
5526	Boscalid			X				X						11,6
1796	Métaldéhyde			X				X						60,6
1694	Tebuconazole				X									1
1474	Chlorprophame		X			X	X	X						4
1780	Xylène							X						1
1209	Linuron								X	X	X	X	X	1
1713	Thiabendazole				X						X			1,2
1866	Chlordécone								X		X			5e-06
1234	Pendiméthaline					X	X							0,02

En complément, pour la chlordécone, les normes suivantes s'appliquent :

- norme de qualité environnementale exprimée en concentration moyenne annuelle dans le biote : 3 µg/kg (poids frais) ;
- norme de qualité environnementale exprimée en concentration moyenne annuelle dans les eaux côtières et de transition : 5e-07 µg/l.

Lorsque le suivi a été réalisé dans le biote, la norme biote s'applique et suffit à évaluer l'état.

Annexe 7 : état écologique des plans d'eau - éléments biologiques

En l'état actuel, trois indices biologiques sont disponibles pour évaluer l'état des plans d'eau métropolitains :

- l'indice phytoplanctonique lacustre (IPLAC) ;
- l'indice biologique macrophytique en lac (IBML) ;
- l'indice Ichtyofaune lacustre (IIL).

L'indice phytoplanctonique lacustre (IPLAC) remplace l'indice IPL et la moyenne estivale de [Chl-a] utilisés pour évaluer l'état des plans d'eau lors du 1er cycle DCE.

Ces indices sont applicables pour évaluer l'état des typologies de plans d'eau visées ci-après :

Indice	Typologie de plans d'eau	
	Plans d'eau naturels	Plans d'eau d'origine anthropique
Indice phytoplanctonique lacustre (IPLAC)	applicable	applicable
Indice biologique macrophytique en lac (IBML)	applicable	applicable
Indice Ichtyofaune lacustre (IIL)	applicable	non applicable

Aucun indice biologique n'est actuellement disponible pour évaluer l'état des éléments de qualité phytobenthos et faune benthique invertébrée. Ces outils d'évaluation sont en cours de développement. Les valeurs des limites de classes d'état, exprimées en EQR, sont énoncées ci-après.

Phytoplancton – indice phytoplanctonique lacustre (code Sandre : 1017)

Valeurs des limites de classes d'état, exprimées en EQR, pour l'Indice Phytoplanctonique LACustre (IPLAC)

ÉLÉMENTS DE QUALITE	INDICE	LIMITES DES CLASSES D'ÉTAT EN EQR			
		Très bon / Bon	Bon / Moyen	Moyen / Médiocre	Médiocre / Mauvais
Phytoplancton	IPLAC	0,8	0,6	0,4	0,2

Macrophytes – indice biologique macrophytique en lac (code Sandre : 7982)

Valeurs de limites de classes d'état, exprimées en EQR, pour l'indice biologique macrophytique en lac (IBML)

ÉLÉMENTS DE QUALITE	INDICE	LIMITES DES CLASSES D'ÉTAT IBML EN EQR			
		Très bon / Bon	Bon / Moyen	Moyen / Médiocre	Médiocre / Mauvais
Macrophytes	IBML	0,8	0,6	0,4	0,2

Poissons – Indice Ichtyofaune Lacustre (code Sandre : 1018)

Valeurs de limites des classes d'état, exprimées en EQR, pour l'indice ichtyofaune lacustre (IIL)

ÉLÉMENTS DE QUALITE	INDICE	LIMITES DES CLASSES D'ÉTAT IIL en EQR			
		Très bon / Bon	Bon / Moyen	Moyen / Médiocre	Médiocre / Mauvais
Poissons	IIL	0,733	0,494	0,4354	0,175

Rappel simplifié de la typologie nationale des plans d'eau

Le tableau ci-après propose un rappel simplifié de la typologie nationale des plans d'eau décrite dans la circulaire DCE 2005/11 relative à la typologie nationale des eaux de surface (cours d'eau, plans d'eau, eau de transition et eaux côtières). Ce tableau est présenté pour mémoire et à titre indicatif.

Plans d'eau naturels
N1 – lacs naturels de haute montagne avec zone littorale N2 – lacs naturels de haute montagne à berges dénudés N3 – lacs naturels de moyenne montagne calcaire, peu profonds N4 – lacs naturels de moyenne montagne calcaire, profonds N5 – lacs naturels de moyenne montagne non calcaire, peu profonds N6 – lacs naturels de moyenne montagne non calcaire, profonds avec zone littorale N7 – lacs naturels de moyenne montagne non calcaire, profonds, sans zone littorale N9 – lacs naturels profonds du bord de l'Atlantique N10 – lacs naturels peu profonds du bord de l'atlantique N11 – lacs naturels de basse altitude de la façade méditerranéenne N12 – autres lacs de basse altitude
Plans d'eau d'origine anthropique
A1 – retenues de haute montagne, profondes A2 – retenues de moyenne montagne, calcaire, peu profondes A3 – retenues de moyenne montagne calcaire, profondes A4 – retenues de moyenne montagne non calcaire, peu profondes A5 – retenues de moyenne montagne non calcaire, profondes A6a – retenues de basse altitude, non calcaires, peu profondes A6b – retenues de basse altitude, non calcaires, profondes A7a – retenues de basse altitude, calcaires, peu profondes A7b – retenues de basse altitude, calcaires, profondes A8 – petits plans d'eau de plaine ou de moyenne montagne, à marnage très important voire fréquent, alimentés par des sources ou des petits cours d'eau A10 – retenues de moyenne montagne, sur socle cristallin, profondes A11 – retenues méditerranéennes de basse altitude, sur socle cristallin, peu profondes A12 – retenues méditerranéennes de basse altitude, sur socle cristallin, profondes A13a – plans d'eau obtenus par creusement ou aménagement de digue, de plaine ou de moyenne montagne, vidangés à intervalle régulier (type pisciculture) A13b – plans d'eau obtenus par creusement ou aménagement de digue, de plaine ou de moyenne montagne, non vidangés mais avec gestion hydraulique (type zone humide transformée) A14 – plans d'eau créés par creusement, en roche dure, non vidangeables A15 – plans d'eau créés par creusement, en lit majeur d'un cours d'eau, en relation avec la nappe, thermocline, berges abruptes A16 – plans d'eau créés par creusement, en lit majeur d'un cours d'eau, en relation avec la nappe, sans thermocline, forme L.

ANNEXE 8 : ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES PLANS D'EAU - PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Les paramètres et valeurs-seuils énumérés ci-après sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvements et d'analyse sont conformes à ceux prescrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.

Localisation du point de prélèvement

Les paramètres physico-chimiques généraux sont mesurés sur un échantillon intégré sur la zone euphotique (2,5 fois la transparence au disque de Secchi) à l'aplomb du point de plus grande profondeur du plan d'eau.

La localisation du point de prélèvement pour les plans d'eau s'appuiera sur les relevés bathymétriques issus du protocole de terrain d'analyse bathymétrique de la forme et des variations de profondeur du plan d'eau, le protocole *Bathymétrie* mis en œuvre dans le cadre de la surveillance des éléments de qualité hydromorphologique.

Ces localisations sont à respecter afin de garantir la cohérence entre les différentes années et campagnes annuelles.

La règle du point le plus profond du plan d'eau est à interpréter conformément au protocole standardisé d'échantillonnage, de conservation, d'observation et de dénombrement du phytoplancton en plan d'eau pour la mise en œuvre de la DCE version 3.3.1 chapitre 2 : en dehors de la zone d'influence du barrage. Il s'agit donc de rechercher le fond de la cuvette du plan d'eau sans tenir compte, notamment, du chenal de vidange du canal à l'amont de l'ouvrage d'évacuation des eaux ou d'un abaissement du fond en pied de digue. Et comme le préconise le même document, le site d'échantillonnage doit être à une distance suffisante de la berge : ceci vaut également pour les digues et barrages. Dans le cas de plans d'eau fractionnés, la recherche de la représentativité conduit également à se placer préférentiellement dans le plan d'eau principal, même si un plan d'eau annexe de la même masse d'eau s'avère plus profond.

A titre indicatif, la notion de distance suffisante de la berge peut s'interpréter comme une distance à la berge d'environ « $10 \cdot Z_{\max}$ ».

Éléments de qualité physico-chimique : température de l'eau, bilan d'oxygène, salinité, état d'acidification

Paramètres par élément de qualité	Limites des classes d'état				
	très bon	bon	moyen	médiocre	mauvais
Bilan de l'oxygène					
Présence ou absence d'une désoxygénation de l'hypolimnion en % du déficit observé entre la surface et le fond pendant la période estivale (pour les lacs stratifiés)	*	50	*	*	
Salinité					
Acidification			*		
Température					

Pour l'élément de qualité bilan d'oxygène, la valeur seuil du bon état est donnée à titre indicatif. L'élément de qualité est classé en état bon si la désoxygénation est inférieure à 50 %.

L'Ilox, indice de saturation en oxygène, peut être pris en compte à titre complémentaire afin de conforter l'évaluation de l'état de l'élément de qualité relatif au bilan d'oxygène.

S'agissant des éléments de qualité salinité, état d'acidification et température de l'eau aucune valeur n'est établie à ce stade des connaissances.

Éléments de qualité physico-chimiques : concentration en nutriments et transparence

Le tableau ci-dessous indique les valeurs des limites de classe pour les paramètres des éléments physico-chimiques concentration en nutriments et transparence pour les plans d'eau. Les limites de classes pour ces paramètres varient en fonction de la profondeur moyenne des plans d'eau. Pour les plans d'eau soumis à de fortes variations de niveau d'eau, la profondeur moyenne du plan d'eau est établie en référence à la cote moyenne du plan d'eau ou à la cote normale d'exploitation. Les méthodes utilisées pour déterminer les limites de classes sont précisées dans le document suivant :

Danis, P.-A. & V. Roubeix (2014) : Physico-chimie soutenant la biologie des plans d'eau nationaux : Principes et méthodes de définition des valeurs-seuils & Amélioration des connaissances par la télédétection. Rapport d'avancement. Convention Onema/Irstea 2013. 82 p.

Paramètres physico-chimiques des éléments nutriment et transparence et calculs des valeurs-seuils

Paramètres physico-chimiques	Unité	Limite	Paramètres de calcul				Calcul	
			a	b	c	d	$Z_{\text{moy}} = \text{profondeur moyenne (m)}$	
Phosphore total (médiane ¹)	$\mu\text{g P.L}^{-1}$	Très bon-Bon	44,174	-0,315	57,744	-0,324	minimum entre $[a * Z_{\text{moy}}^b]$ et $[c * (Z_{\text{moy}} + 1)^d]$	
		Bon-Moyen	61,714	-0,310	95,841	-0,267		
		Moyen-Médiocre	86,234	-0,306	159,92	-0,210		
		Médiocre-Mauvais	120,63	-0,302	268,66	-0,153		
Ammonium (valeur maximale)	$\mu\text{g NH}_4.\text{L}^{-1}$	Très bon-Bon	223,58	-0,248	199,25	-0,223		
		Bon-Moyen	290,91	-0,245	283,69	-0,185		
		Moyen-Médiocre	378,71	-0,241	404,53	-0,145		
		Médiocre-Mauvais	494,03	-0,238	578,19	-0,106		
Profondeur du disque de Secchi (médiane)	m	Très bon-Bon	1,1741	0,284	0,9989	0,277	maximum entre $[a * Z_{\text{moy}}^b]$ et $[c * (Z_{\text{moy}} + 1)^d]$	
		Bon-Moyen	0,8703	0,279	0,6492	0,228		
		Moyen-Médiocre	0,6447	0,275	0,4208	0,180		
		Médiocre-Mauvais	0,4766	0,271	0,2722	0,131		
							$Z_{\text{moy}} \leq 15$	$Z_{\text{moy}} > 15$
Nitrates ² (valeur maximale)	$\mu\text{g NO}_3.\text{L}^{-1}$	Très bon-Bon					2 200	1 200
		Bon-Moyen					5 300	2 600
		Moyen-Médiocre					12 600	5 600
		Médiocre-Mauvais					30 100	12 100

¹ Pour le Phosphore total, le fait de prendre en compte la valeur médiane peut parfois conduire, selon les mesures disponibles, à des valeurs faibles et non déclassantes en contradiction avec la valeur de l'indice IPLAC. Dans ces cas, une expertise sur la distribution des valeurs de phosphore total est à réaliser et les valeurs-seuils de phosphore total calculées pourront être considérées à titre indicatives.

Les valeurs-seuils calculées à l'aide du tableau ci-dessus sont arrondies :

- au microgramme/litre supérieur pour le phosphore total et l'ammonium ;
- au centimètre près inférieur pour la profondeur et la transparence.

La classification de l'état physico-chimique prend en compte les données acquises conformément aux dispositions de l'article 12 et de l'annexe 9 de l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010 modifié.

La classification de l'état physico-chimique des plans d'eau s'établit de la manière suivante :

- lorsque le plan d'eau fait l'objet d'une seule année de suivi au cours de la période à prendre en compte au titre de l'article 12, la classification s'établit en comparant aux valeurs du tableau ci-dessus :
 - la médiane des valeurs observées pour le phosphore total et la profondeur du disque de Secchi ;
 - la valeur maximale pour l'ammonium et les nitrates ;
- lorsque le plan d'eau fait l'objet de plusieurs années de suivis au cours de la période à prendre en compte au titre de l'article 12, la classification s'établit en comparant aux valeurs du tableau ci-dessus les valeurs médianes des évaluations annuelles.

Lorsque les concentrations mesurées pour un paramètre sont inférieures à sa limite de quantification, la valeur de la concentration à prendre en compte est celle de la limite de quantification de ce paramètre divisée par deux.

A titre indicatif, les valeurs-seuils par plan d'eau pour les différents paramètres sont données ci-après.

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
FL1	AG	31,6	14,9	21,1	30	42,5	91,5	125,1	164,8	217	3,13	2,28	1,66	1,22
FL10	AG	5,7	25,5	36	50,6	71,3	130,3	190	248,9	326,3	1,92	1,41	1,04	0,76
FL100	AG	12,45	20	28,2	39,9	56,3	111,5	157	206,3	270,9	2,4	1,76	1,29	0,94
FL101	AG	6,29	24,8	34,9	49,1	69,2	127,9	185,5	243,1	318,7	1,98	1,45	1,07	0,78
FL102	AG	5,16	26,3	37,1	52,2	73,5	132,8	194,8	255	334,1	1,87	1,38	1,01	0,74
FL103	AG	12,09	20,2	28,5	40,2	56,8	112,2	158,2	207,7	272,8	2,38	1,74	1,28	0,94
FL104	AG	6,45	24,6	34,6	48,8	68,7	127,2	184,4	241,7	316,8	1,99	1,46	1,08	0,79
FL105	AG	1,08	43,2	60,3	84,3	118	169,3	248	363,8	485,6	1,22	0,89	0,66	0,49
FL106	AG	6,65	24,3	34,3	48,3	68,1	126,5	183,1	239,9	314,6	2,01	1,48	1,08	0,8
FL107	AG	5,33	26,1	36,7	51,7	72,8	131,9	193,2	253	331,5	1,89	1,39	1,02	0,75
FL11	AG	8,69	22,4	31,5	44,5	62,8	120	171,4	224,9	295,1	2,17	1,59	1,17	0,86
FL12	AG	13,05	19,7	27,8	39,3	55,5	110,4	155,2	203,9	267,9	2,43	1,78	1,3	0,96
FL13	AG	4,15	28,2	39,7	55,8	78,5	138,2	205,4	268,8	352	1,76	1,29	0,95	0,7
FL14	AG	8,73	22,3	31,5	44,5	62,7	119,9	171,3	224,7	294,8	2,17	1,59	1,17	0,86
FL15	AG	0,6	49,6	72,3	100,8	140,7	179,4	260,1	377,8	550,1	1,14	0,75	0,56	0,41
FL16	AG	22,37	16,6	23,5	33,3	47,2	98,6	136,1	179,1	235,6	2,84	2,07	1,51	1,11
FL17	AG	6,45	24,6	34,6	48,8	68,7	127,2	184,4	241,7	316,8	1,99	1,46	1,08	0,79
FL18	AG	45,22	13,3	18,9	26,9	38,2	84,6	114,6	151,1	199,2	3,46	2,52	1,84	1,34

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
FL19	AG	7,74	23,2	32,7	46,1	65	122,8	176,4	231,3	303,4	2,1	1,54	1,13	0,83
FL2	AG	9,67	21,6	30,5	43,1	60,8	117,4	167	219,2	287,7	2,24	1,64	1,2	0,88
FL20	AG	5,59	25,7	36,2	50,9	71,7	130,8	191	250,1	327,8	1,91	1,41	1,03	0,76
FL21	AG	55,89	12,4	17,7	25,2	35,8	80,8	108,8	143,6	189,4	3,68	2,67	1,95	1,42
FL22	AG	24,7	16,1	22,8	32,3	45,8	96,5	132,8	174,8	230,1	2,92	2,13	1,55	1,14
FL23	AG	3,03	31,2	43,8	61,5	86,3	146	219,4	290	379,4	1,61	1,19	0,87	0,64
FL24	AG	56,73	12,4	17,6	25,1	35,6	80,6	108,4	143,1	188,7	3,69	2,68	1,95	1,42
FL25	AG	3,65	29,4	41,3	58,1	81,6	141,4	212	277,2	362,9	1,7	1,25	0,92	0,68
FL26	AG	18,91	17,5	24,8	35,1	49,7	102,2	141,8	186,5	245,2	2,7	1,98	1,44	1,06
FL27	AG	3,41	30	42,2	59,3	83,3	143,1	215,6	281,8	368,9	1,66	1,22	0,9	0,66
FL28	AG	10,33	21,2	29,9	42,2	59,6	115,9	164,4	215,7	283,2	2,28	1,67	1,22	0,9
FL29	AG	4,38	27,7	39	54,9	77,2	136,9	202,8	265,3	347,5	1,79	1,31	0,97	0,71
FL3	AG	5,8	25,4	35,8	50,4	70,9	129,9	189,3	247,9	325	1,93	1,42	1,04	0,77
FL30	AG	28,87	15,3	21,7	30,8	43,7	93,3	127,8	168,4	221,7	3,05	2,22	1,62	1,19
FL31	AG	13,61	19,4	27,5	38,8	54,8	109,5	153,7	201,9	265,2	2,46	1,8	1,32	0,97
FL32	AG	28,38	15,4	21,9	31	43,9	93,7	128,4	169,1	222,6	3,03	2,21	1,62	1,18
FL33	AG	16	18,4	26,1	36,9	52,2	105,8	147,7	194,1	255,2	2,58	1,89	1,38	1,01
FL34	AG	22,77	16,5	23,4	33,2	47	98,2	135,5	178,3	234,6	2,85	2,08	1,52	1,11
FL35	AG	10,6	21	29,7	41,9	59,1	115,3	163,3	214,4	281,5	2,29	1,68	1,23	0,9
FL36	AG	24,61	16,1	22,8	32,4	45,9	96,6	132,9	175	230,3	2,91	2,13	1,55	1,14
FL37	AG	9,84	21,5	30,4	42,9	60,5	117	166,3	218,3	286,5	2,25	1,65	1,21	0,89
FL38	AG	4,32	27,9	39,2	55,1	77,5	137,2	203,4	266,1	348,5	1,78	1,31	0,96	0,71
FL39	AG	9,39	21,8	30,8	43,5	61,3	118,1	168,2	220,7	289,7	2,22	1,63	1,19	0,87
FL4	AG	16	18,4	26,1	36,9	52,2	105,8	147,7	194,1	255,2	2,58	1,89	1,38	1,01
FL40	AG	6,91	24	33,9	47,8	67,3	125,6	181,4	237,7	311,7	2,03	1,49	1,1	0,8
FL41	AG	4,7	27,1	38,2	53,7	75,6	135,1	199,3	260,9	341,7	1,82	1,34	0,99	0,72
FL42	AG	4,38	27,7	39	54,9	77,2	136,8	202,7	265,3	347,4	1,79	1,31	0,97	0,71
FL43	AG	32,97	14,7	20,9	29,6	42	90,7	123,8	163,1	214,8	3,17	2,31	1,68	1,23
FL44	AG	9,54	21,7	30,6	43,3	61,1	117,8	167,6	219,9	288,6	2,23	1,63	1,2	0,88
FL45	AG	7,48	23,4	33,1	46,6	65,7	123,6	177,9	233,2	305,8	2,08	1,53	1,12	0,82
FL46	AG	25,62	15,9	22,6	32	45,3	95,7	131,6	173,3	228,1	2,95	2,15	1,57	1,15

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
FL43	AG	32,97	14,7	20,9	29,6	42	90,7	123,8	163,1	214,8	3,17	2,31	1,68	1,23
FL44	AG	9,54	21,7	30,6	43,3	61,1	117,8	167,6	219,9	288,6	2,23	1,63	1,2	0,88
FL45	AG	7,48	23,4	33,1	46,6	65,7	123,6	177,9	233,2	305,8	2,08	1,53	1,12	0,82
FL46	AG	25,62	15,9	22,6	32	45,3	95,7	131,6	173,3	228,1	2,95	2,15	1,57	1,15
FL47	AG	5,3	26,1	36,8	51,8	72,9	132,1	193,5	253,4	332	1,88	1,39	1,02	0,75
FL48	AG	20,05	17,2	24,3	34,5	48,8	100,9	139,8	183,9	241,8	2,75	2,01	1,47	1,07
FL49	AG	3,27	30,4	42,7	60	84,4	144,1	217,1	284,7	372,5	1,64	1,21	0,89	0,66
FL5	AG	9,18	22	31	43,8	61,8	118,7	169,2	221,9	291,3	2,2	1,61	1,18	0,87
FL50	AG	11,37	20,5	29	41	57,9	113,6	160,5	210,8	276,8	2,34	1,71	1,26	0,92
FL51	AG	16,34	18,3	25,9	36,7	51,9	105,4	146,9	193,2	253,9	2,59	1,9	1,39	1,02
FL52	AG	5,44	25,9	36,5	51,4	72,4	131,5	192,3	251,8	330	1,9	1,4	1,03	0,75
FL53	AG	10,72	20,9	29,6	41,8	58,9	115	162,9	213,8	280,7	2,3	1,69	1,24	0,91
FL54	AG	8,25	22,7	32,1	45,2	63,8	121,3	173,7	227,8	298,8	2,14	1,57	1,15	0,84
FL55	AG	2,32	33,9	47,5	66,7	93,6	152,4	227,4	309,2	404,3	1,49	1,1	0,81	0,6
FL56	AG	0,78	47,8	66,7	93,1	130,1	175,2	255,1	372,1	524,4	1,17	0,81	0,6	0,45
FL57	AG	8,33	22,7	32	45,1	63,6	121	173,3	227,2	298,1	2,14	1,57	1,15	0,85
FL58	AG	12,88	19,8	27,9	39,5	55,8	110,7	155,7	204,6	268,7	2,42	1,77	1,3	0,95
FL59	AG	11,23	20,6	29,1	41,2	58,1	113,9	161	211,4	277,6	2,33	1,71	1,25	0,92
FL6	AG	41,06	13,7	19,5	27,7	39,3	86,5	117,3	154,7	203,8	3,37	2,45	1,79	1,31
FL60	AG	30,39	15,1	21,4	30,4	43	92,3	126,3	166,3	219	3,09	2,25	1,65	1,2
FL61	AG	10,57	21	29,7	41,9	59,2	115,3	163,5	214,6	281,7	2,29	1,68	1,23	0,9
FL62	AG	20,36	17,1	24,2	34,3	48,6	100,6	139,2	183,2	240,9	2,76	2,02	1,47	1,08
FL63	AG	1,94	35,9	50,3	70,5	98,8	156,7	232,6	323	422,1	1,42	1,05	0,77	0,57
FL64	AG	6,98	24	33,8	47,6	67,1	125,3	180,9	237,1	310,9	2,04	1,5	1,1	0,81
FL65	AG	5,57	25,7	36,2	51	71,8	130,9	191,1	250,3	328,1	1,91	1,4	1,03	0,76
FL66	AG	41,45	13,7	19,4	27,6	39,2	86,3	117	154,3	203,4	3,38	2,46	1,79	1,31
FL67	AG	2,83	31,8	44,7	62,7	88,1	147,6	221,4	294,6	385,4	1,58	1,16	0,86	0,63
FL68	AG	11,85	20,3	28,7	40,5	57,2	112,7	158,9	208,7	274,1	2,37	1,73	1,27	0,93
FL69	AG	5,16	26,3	37,1	52,2	73,5	132,8	194,8	255	334,1	1,87	1,38	1,01	0,74
FL7	AG	6,19	24,9	35,1	49,4	69,6	128,3	186,3	244,1	320	1,97	1,45	1,06	0,78
FL70	AG	52,62	12,7	18	25,7	36,5	81,9	110,4	145,7	192,1	3,62	2,63	1,91	1,4

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
FL7	AG	6,19	24,9	35,1	49,4	69,6	128,3	186,3	244,1	320	1,97	1,45	1,06	0,78
FL70	AG	52,62	12,7	18	25,7	36,5	81,9	110,4	145,7	192,1	3,62	2,63	1,91	1,4
FL71	AG	16,14	18,4	26	36,8	52,1	105,6	147,4	193,7	254,6	2,59	1,89	1,38	1,01
FL72	AG	0,57	49,9	73,4	102,3	142,8	180,1	261	378,8	551,1	1,13	0,74	0,55	0,41
FL73	AG	27,44	15,6	22,1	31,3	44,4	94,4	129,4	170,5	224,4	3,01	2,19	1,6	1,17
FL74	AG	15,57	18,6	26,3	37,2	52,7	106,4	148,7	195,4	256,8	2,56	1,87	1,37	1
FL75	AG	7,56	23,4	32,9	46,5	65,5	123,4	177,4	232,6	305,1	2,08	1,53	1,12	0,82
FL76	AG	0,91	45,5	63,5	88,7	124	172,4	251,7	368,2	504,8	1,2	0,85	0,63	0,47
FL77	AG	8,62	22,4	31,6	44,6	63	120,2	171,8	225,3	295,7	2,16	1,59	1,16	0,85
FL78	AG	13,32	19,5	27,6	39,1	55,2	110	154,5	202,9	266,6	2,45	1,79	1,31	0,96
FL79	AG	6,53	24,5	34,5	48,6	68,5	126,9	183,9	241	315,9	2	1,47	1,08	0,79
FL8	AG	9,72	21,6	30,5	43	60,7	117,3	166,8	218,9	287,3	2,24	1,64	1,2	0,88
FL80	AG	8,59	22,4	31,7	44,7	63	120,3	172	225,5	295,9	2,16	1,59	1,16	0,85
FL81	AG	5,44	25,9	36,5	51,4	72,4	131,5	192,3	251,8	330	1,9	1,4	1,03	0,75
FL82	AG	1,29	40,8	57	79,8	111,7	165,6	243,5	356,2	464,9	1,26	0,93	0,69	0,51
FL83	AG	11,02	20,7	29,3	41,4	58,5	114,4	161,8	212,4	278,9	2,32	1,7	1,25	0,91
FL84	AG	11,14	20,7	29,2	41,3	58,3	114,1	161,3	211,8	278,1	2,33	1,7	1,25	0,92
FL85	AG	9,02	22,1	31,2	44	62,1	119,1	169,9	222,9	292,5	2,19	1,61	1,18	0,87
FL86	AG	4,1	28,3	39,8	56	78,8	138,5	206	269,5	352,9	1,75	1,29	0,95	0,7
FL87	AG	33,76	14,6	20,7	29,4	41,7	90,2	123	162,2	213,6	3,19	2,32	1,69	1,24
FL88	AG	34,61	14,5	20,5	29,2	41,4	89,7	122,3	161,2	212,3	3,21	2,34	1,71	1,25
FL89	AG	0,6	49,6	72,4	101	141	179,5	260,2	378	550,2	1,14	0,75	0,56	0,41
FL9	AG	2	35,5	49,8	69,8	97,9	155,9	231,7	320,5	418,8	1,43	1,06	0,78	0,58
FL90	AG	24,46	16,1	22,9	32,4	45,9	96,7	133,1	175,3	230,6	2,91	2,12	1,55	1,13
FL91	AG	10,33	21,2	29,9	42,2	59,6	115,9	164,4	215,7	283,2	2,28	1,67	1,22	0,9
FL92	AG	18,19	17,7	25,1	35,5	50,2	103	143,1	188,2	247,5	2,67	1,95	1,43	1,05
FL93	AG	17,49	17,9	25,4	35,9	50,8	103,9	144,5	190	249,8	2,64	1,93	1,41	1,04
FL94	AG	3,58	29,6	41,5	58,4	82,1	141,8	212,9	278,5	364,5	1,69	1,24	0,92	0,67
FL95	AG	5,84	25,3	35,7	50,3	70,8	129,7	189	247,5	324,5	1,94	1,42	1,05	0,77
FL96	AG	4,23	28	39,4	55,5	78	137,7	204,4	267,5	350,3	1,77	1,3	0,96	0,7
FL97	AG	7,67	23,3	32,8	46,3	65,2	123	176,8	231,8	304	2,09	1,54	1,13	0,83

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
FL98	AG	3,82	29	40,7	57,2	80,5	140,2	209,6	274,1	358,9	1,72	1,26	0,93	0,69
FL99	AG	16,06	18,4	26,1	36,9	52,2	105,7	147,5	194	254,9	2,58	1,89	1,38	1,01
AL01	AP	1,74	37,1	52	72,9	102,1	159,1	235,6	331,6	433,2	1,37	1,01	0,75	0,55
AL02	AP	0,92	45,3	63,3	88,4	123,7	172,2	251,5	367,9	503,8	1,2	0,85	0,63	0,47
AL03	AP	1,62	38	53,1	74,4	104,3	160,7	237,5	337,2	440,4	1,35	1	0,74	0,54
AL04	AP	1,29	40,8	57	79,8	111,7	165,6	243,5	356,3	465,1	1,26	0,93	0,69	0,51
B2L05	AP	3,35	30,2	42,4	59,6	83,7	143,5	216,3	282,9	370,3	1,66	1,22	0,9	0,66
GL001	LB	6,39	24,6	34,7	48,9	68,9	127,5	184,8	242,2	317,5	1,99	1,46	1,07	0,79
GL002	LB	12,92	19,7	27,9	39,4	55,7	110,7	155,6	204,4	268,5	2,43	1,78	1,3	0,95
GL002	LB	21,28	16,9	23,9	33,9	47,9	99,6	137,7	181,3	238,4	2,8	2,04	1,49	1,09
GL004	LB	2,57	32,8	46	64,6	90,7	149,9	224,3	301,6	394,4	1,54	1,13	0,84	0,62
GL005	LB	20,72	17	24,1	34,1	48,3	100,2	138,6	182,4	239,9	2,78	2,03	1,48	1,08
GL006	LB	98,16	10,4	14,9	21,2	30,2	71,4	94,8	125,4	165,6	4,32	3,13	2,27	1,65
GL007	LB	3,26	30,4	42,8	60,1	84,4	144,2	217,2	284,8	372,8	1,64	1,21	0,89	0,66
GL008	LB	1,77	36,9	51,7	72,4	101,5	158,7	235,1	330	431,1	1,38	1,02	0,75	0,56
GL009	LB	1	44,2	61,7	86,3	120,7	170,7	249,7	365,8	494,2	1,21	0,87	0,64	0,48
GL010	LB	2,99	31,3	43,9	61,7	86,6	146,3	219,8	290,8	380,4	1,6	1,18	0,87	0,64
GL011	LB	7,47	23,4	33,1	46,6	65,7	123,6	177,9	233,2	305,9	2,08	1,52	1,12	0,82
GL012	LB	1	44,2	61,8	86,4	120,8	170,8	249,8	365,9	494,6	1,21	0,87	0,64	0,48
GL013	LB	7,8	23,1	32,6	46	64,9	122,6	176,1	230,9	302,8	2,1	1,54	1,13	0,83
GL014	LB	1	44,1	61,7	86,2	120,5	170,6	249,6	365,7	493,7	1,21	0,87	0,65	0,48
GL015	LB	5,97	25,2	35,4	49,9	70,3	129,2	187,9	246,2	322,7	1,95	1,43	1,05	0,77
GL016	LB	17,5	17,9	25,4	35,9	50,8	103,9	144,5	190	249,8	2,65	1,93	1,41	1,04
GL016	LB	2,15	34,7	48,7	68,2	95,7	154,2	229,6	314,9	411,7	1,46	1,08	0,8	0,59
GL017	LB	4,44	27,6	38,9	54,7	76,9	136,5	202	264,4	346,3	1,79	1,32	0,97	0,71
GL018	LB	5,93	25,2	35,5	50	70,5	129,3	188,2	246,6	323,2	1,95	1,43	1,05	0,77
GL019	LB	7,12	23,8	33,6	47,3	66,7	124,8	180	235,9	309,4	2,05	1,5	1,11	0,81
GL020	LB	3,91	28,8	40,4	56,8	79,9	139,7	208,4	272,6	357	1,73	1,27	0,94	0,69
GL021	LB	1,98	35,6	49,9	69,9	98,1	156,1	231,9	321,1	419,6	1,43	1,05	0,78	0,57
GL023	LB	9,88	21,5	30,3	42,8	60,4	116,9	166,1	218	286,2	2,25	1,65	1,21	0,89
GL025	LB	6,65	24,3	34,3	48,3	68,1	126,5	183	239,9	314,5	2,01	1,48	1,08	0,8

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
GL025	LB	7,22	23,7	33,4	47,1	66,4	124,5	179,4	235,2	308,5	2,06	1,51	1,11	0,81
GL025	LB	8,94	22,2	31,3	44,1	62,3	119,3	170,3	223,3	293,1	2,19	1,6	1,18	0,86
GL026	LB	2,69	32,4	45,4	63,7	89,5	148,9	223	298,4	390,3	1,55	1,15	0,85	0,62
GL027	LB	8,58	22,5	31,7	44,7	63	120,3	172	225,6	296	2,16	1,58	1,16	0,85
GL027	LB	7,25	23,7	33,4	47,1	66,3	124,4	179,2	235	308,2	2,06	1,51	1,11	0,82
GL029	LB	8,35	22,6	31,9	45,1	63,6	120,9	173,1	227,1	297,9	2,14	1,57	1,15	0,85
GL030	LB	12,45	20	28,2	39,9	56,3	111,5	157	206,2	270,9	2,4	1,76	1,29	0,94
GL032	LB	1,04	43,7	61	85,3	119,3	170	248,8	364,8	489,8	1,22	0,88	0,65	0,48
GL033	LB	1,99	35,6	49,9	69,9	98,1	156,1	231,9	321	419,5	1,43	1,05	0,78	0,57
GL034	LB	12	20,2	28,5	40,3	57	112,4	158,5	208,1	273,3	2,38	1,74	1,28	0,94
GL035	LB	9,58	21,7	30,6	43,2	61	117,7	167,4	219,7	288,3	2,23	1,63	1,2	0,88
GL036	LB	3,62	29,5	41,4	58,2	81,8	141,6	212,4	277,7	363,6	1,69	1,25	0,92	0,68
GL036	LB	12,3	20	28,3	40	56,6	111,8	157,5	206,9	271,7	2,39	1,75	1,28	0,94
GL038	LB	3	31,3	43,9	61,6	86,6	146,2	219,7	290,6	380,2	1,6	1,18	0,87	0,64
GL039	LB	7,55	23,4	33	46,5	65,5	123,4	177,5	232,7	305,2	2,08	1,53	1,12	0,82
GL040	LB	2,99	31,3	43,9	61,7	86,7	146,3	219,8	290,9	380,6	1,6	1,18	0,87	0,64
GL041	LB	1,34	40,3	56,4	78,9	110,5	164,9	242,6	353,2	461,1	1,27	0,94	0,7	0,52
GL042	LB	1,04	43,6	60,9	85,1	119	169,8	248,6	364,6	488,9	1,22	0,88	0,65	0,48
GL043	LB	7,28	23,6	33,3	47	66,2	124,3	179	234,7	307,8	2,06	1,51	1,11	0,82
GL044	LB	2,45	33,3	46,8	65,6	92,1	151,1	225,8	305,2	399,2	1,51	1,12	0,82	0,61
GL045	LB	2,4	33,5	47,1	66	92,6	151,6	226,4	306,8	401,1	1,5	1,11	0,82	0,6
GL046	LB	5,6	25,7	36,2	50,9	71,7	130,8	190,9	250,1	327,7	1,91	1,41	1,03	0,76
GL047	LB	2,88	31,7	44,5	62,4	87,7	147,2	221	293,6	384,1	1,58	1,17	0,86	0,63
GL048	LB	1,93	35,9	50,3	70,5	98,9	156,7	232,7	323,3	422,5	1,41	1,05	0,77	0,57
GL049	LB	2,82	31,9	44,7	62,8	88,2	147,7	221,5	294,9	385,8	1,58	1,16	0,86	0,63
GL050	LB	1,86	36,3	50,9	71,3	100	157,5	233,7	326	426	1,4	1,04	0,76	0,56
GL051	LB	1,01	44	61,5	85,9	120,2	170,4	249,4	365,5	492,6	1,21	0,87	0,65	0,48
GL052	LB	0,86	46,2	64,6	90,2	126,1	173,4	252,9	369,5	511,5	1,19	0,84	0,62	0,46
GL053	LB	0,8	47,5	66,2	92,5	129,2	174,8	254,7	371,6	521,7	1,17	0,82	0,61	0,45
GL054	LB	1,71	37,3	52,2	73,1	102,5	159,4	236	332,6	434,5	1,37	1,01	0,75	0,55
GL055	LB	2,86	31,7	44,5	62,5	87,8	147,3	221,1	293,9	384,4	1,58	1,17	0,86	0,63

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
GL056	LB	1,18	42	58,7	82	114,8	167,5	245,8	361,3	475,2	1,24	0,91	0,67	0,5
GL057	LB	8,44	22,6	31,8	44,9	63,3	120,7	172,7	226,5	297,1	2,15	1,58	1,16	0,85
GL058	LB	8,31	22,7	32	45,1	63,7	121,1	173,4	227,4	298,3	2,14	1,57	1,15	0,85
GL059	LB	2,55	32,9	46,2	64,8	91	150,2	224,6	302,3	395,4	1,53	1,13	0,83	0,61
GL059	LB	6,28	24,8	34,9	49,2	69,3	127,9	185,7	243,3	318,9	1,98	1,45	1,07	0,78
GL060	LB	4,14	28,2	39,7	55,9	78,6	138,3	205,6	269	352,2	1,76	1,29	0,95	0,7
GL061	LB	20,67	17	24,1	34,2	48,3	100,2	138,7	182,5	240	2,77	2,02	1,48	1,08
GL061	LB	4,39	27,7	39	54,8	77,2	136,8	202,6	265,1	347,2	1,79	1,31	0,97	0,71
GL061	LB	5,62	25,7	36,1	50,9	71,6	130,7	190,8	249,8	327,5	1,92	1,41	1,04	0,76
GL063	LB	1	44,1	61,7	86,2	120,5	170,6	249,6	365,7	493,7	1,21	0,87	0,65	0,48
GL065	LB	1	44,1	61,7	86,2	120,6	170,6	249,6	365,7	493,8	1,21	0,87	0,65	0,48
GL066	LB	0,67	48,9	69,9	97,4	136,1	177,7	258,1	375,5	543,3	1,15	0,78	0,58	0,43
GL066	LB	0,95	44,9	62,8	87,7	122,6	171,7	250,9	367,2	500,4	1,2	0,86	0,64	0,47
GL068	LB	1,87	36,2	50,8	71,2	99,8	157,4	233,5	325,5	425,4	1,4	1,04	0,77	0,57
GL069	LB	0,98	44,5	62,1	86,8	121,4	171,1	250,2	366,4	496,6	1,21	0,87	0,64	0,47
GL070	LB	1,03	43,8	61,2	85,5	119,7	170,2	249	365,1	490,9	1,21	0,88	0,65	0,48
GL070	LB	2,37	33,7	47,2	66,2	93	151,9	226,8	307,6	402,2	1,5	1,11	0,82	0,6
GL071	LB	1,01	44,1	61,6	86,1	120,4	170,6	249,5	365,6	493,3	1,21	0,87	0,65	0,48
GL072	LB	0,93	45,1	63	88	123,1	172	251,2	367,6	502,1	1,2	0,85	0,63	0,47
GL073	LB	1	44,1	61,7	86,2	120,5	170,6	249,6	365,7	493,7	1,21	0,87	0,65	0,48
GL074	LB	1,01	44,1	61,6	86	120,4	170,5	249,5	365,6	493,1	1,21	0,87	0,65	0,48
GL075	LB	1,02	43,9	61,3	85,7	119,9	170,3	249,2	365,3	491,6	1,21	0,88	0,65	0,48
GL076	LB	1,99	35,6	49,8	69,9	98	156	231,8	320,8	419,3	1,43	1,05	0,78	0,57
GL077	LB	1,1	42,9	60	83,9	117,4	168,9	247,5	363,3	483,4	1,23	0,89	0,66	0,49
GL079	LB	1	44,1	61,7	86,2	120,5	170,6	249,6	365,7	493,7	1,21	0,87	0,65	0,48
GL080	LB	2	35,5	49,8	69,8	97,9	155,9	231,7	320,5	418,9	1,43	1,06	0,78	0,58
GL081	LB	1	44,2	61,8	86,3	120,7	170,7	249,7	365,9	494,3	1,21	0,87	0,64	0,48
GL083	LB	0,79	47,6	66,4	92,7	129,5	174,9	254,8	371,7	522,5	1,17	0,82	0,6	0,45
GL084	LB	1	44,1	61,6	86,1	120,5	170,6	249,6	365,7	493,6	1,21	0,87	0,65	0,48
GL085	LB	6,02	25,1	35,4	49,8	70,2	128,9	187,6	245,7	322,1	1,95	1,44	1,06	0,78
GL085	LB	19,89	17,2	24,4	34,6	48,9	101,1	140	184,2	242,3	2,74	2	1,46	1,07

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
GL087	LB	0,4	51,8	82	114,1	159,1	184,8	266,6	385,2	557,9	1,1	0,7	0,5	0,37
GL088	LB	0,99	44,3	61,9	86,5	121	170,9	249,9	366,1	495,2	1,21	0,87	0,64	0,48
GL089	LB	2,65	32,5	45,6	64	89,9	149,3	223,5	299,6	391,8	1,55	1,14	0,84	0,62
GL090	LB	1,02	43,9	61,3	85,7	119,9	170,3	249,2	365,2	491,6	1,21	0,88	0,65	0,48
GL091	LB	1,99	35,5	49,8	69,8	97,9	156	231,7	320,6	419,1	1,43	1,06	0,78	0,57
GL092	LB	0,98	44,5	62,2	86,8	121,5	171,1	250,2	366,4	496,7	1,21	0,86	0,64	0,47
GL093	LB	1,04	43,7	61	85,3	119,3	170	248,8	364,9	489,9	1,22	0,88	0,65	0,48
GL094	LB	1,01	44,1	61,6	86	120,3	170,5	249,5	365,6	493,1	1,21	0,87	0,65	0,48
GL095	LB	0,36	52,2	84,4	117,4	163,5	185,9	267,9	386,7	559,4	1,09	0,7	0,49	0,36
GL096	LB	26,89	15,7	22,2	31,5	44,7	94,8	130,1	171,3	225,5	2,99	2,18	1,59	1,16
GL097	LB	14,14	19,2	27,1	38,4	54,2	108,6	152,2	200	262,8	2,49	1,82	1,33	0,98
GL098	LB	6,91	24	33,9	47,8	67,3	125,6	181,4	237,7	311,7	2,03	1,49	1,1	0,8
GL099	LB	0,99	44,4	62	86,6	121,2	171	250	366,2	495,7	1,21	0,87	0,64	0,47
GL100	LB	16,75	18,2	25,7	36,4	51,5	104,8	146	192	252,4	2,61	1,91	1,4	1,02
GL102	LB	0,99	44,4	62	86,6	121,1	170,9	250	366,2	495,6	1,21	0,87	0,64	0,47
GL103	LB	1,59	38,2	53,5	74,9	104,9	161,2	238,1	338,9	442,6	1,34	0,99	0,73	0,54
GL104	LB	2,01	35,4	49,7	69,6	97,7	155,8	231,5	320	418,2	1,43	1,06	0,78	0,58
GL105	LB	3,83	28,9	40,7	57,2	80,4	140,2	209,5	274	358,7	1,72	1,27	0,93	0,69
GL106	LB	2,01	35,5	49,7	69,7	97,7	155,8	231,5	320,1	418,4	1,43	1,06	0,78	0,58
GL107	LB	0,98	44,5	62,1	86,8	121,4	171,1	250,1	366,3	496,4	1,21	0,87	0,64	0,47
GL108	LB	1,8	36,7	51,4	72,1	101	158,3	234,6	328,7	429,5	1,39	1,03	0,76	0,56
GL109	LB	1,49	38,9	54,5	76,3	106,9	162,5	239,7	343,8	449	1,32	0,97	0,72	0,53
GL110	LB	3,63	29,4	41,4	58,1	81,7	141,5	212,2	277,5	363,3	1,69	1,25	0,92	0,68
GL111	LB	2,02	35,4	49,6	69,6	97,6	155,7	231,4	319,8	418	1,43	1,06	0,78	0,58
GL112	LB	4,36	27,8	39,1	55	77,4	137	203	265,6	347,9	1,78	1,31	0,97	0,71
GL113	LB	18,12	17,7	25,1	35,6	50,3	103,1	143,3	188,4	247,7	2,67	1,95	1,43	1,05
GL114	LB	4,03	28,5	40	56,3	79,2	138,9	206,9	270,6	354,4	1,74	1,28	0,95	0,7
GL114	LB	8,32	22,7	32	45,1	63,6	121	173,3	227,3	298,2	2,14	1,57	1,15	0,85
GL116	LB	1	44,2	61,7	86,2	120,6	170,7	249,6	365,8	494	1,21	0,87	0,64	0,48
GL117	LB	4,21	28,1	39,5	55,6	78,2	137,8	204,7	267,8	350,7	1,77	1,3	0,96	0,7
GL118	LB	1,71	37,3	52,2	73,2	102,5	159,4	236	332,7	434,6	1,37	1,01	0,75	0,55

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
GL119	LB	2,36	33,7	47,3	66,3	93,1	152	226,9	308	402,7	1,5	1,11	0,82	0,6
GL120	LB	2,79	32	44,9	63	88,5	148	221,9	295,7	386,8	1,57	1,16	0,85	0,63
GL121	LB	3,24	30,5	42,9	60,2	84,6	144,3	217,4	285,3	373,4	1,64	1,21	0,89	0,66
GL122	LB	12,73	19,8	28	39,6	56	111	156,2	205,1	269,4	2,42	1,77	1,3	0,95
GL122	LB	19,61	17,3	24,5	34,7	49,1	101,4	140,5	184,9	243,1	2,73	2	1,46	1,07
GL123	LB	2,03	35,4	49,6	69,5	97,5	155,6	231,3	319,4	417,5	1,43	1,06	0,78	0,58
GL124	LB	7,46	23,5	33,1	46,6	65,8	123,7	178	233,3	306	2,08	1,52	1,12	0,82
GL125	LB	50,83	12,8	18,2	25,9	36,8	82,5	111,3	146,9	193,7	3,58	2,6	1,9	1,38
GL126	LB	2,99	31,3	43,9	61,7	86,6	146,2	219,8	290,7	380,4	1,6	1,18	0,87	0,64
GL127	LB	3,04	31,1	43,7	61,4	86,3	145,9	219,3	289,8	379,1	1,61	1,19	0,87	0,64
GL128	LB	38,95	13,9	19,8	28,1	39,9	87,5	118,8	156,7	206,4	3,32	2,42	1,76	1,29
GL129	LB	4,33	27,9	39,2	55,1	77,5	137,2	203,3	266,1	348,5	1,78	1,31	0,96	0,71
GL130	LB	7,82	23,1	32,6	46	64,8	122,5	175,9	230,7	302,6	2,1	1,54	1,13	0,83
GL131	LB	1,31	40,6	56,8	79,4	111,2	165,3	243,2	355	463,5	1,27	0,94	0,69	0,51
GL132	LB	1,41	39,7	55,5	77,7	108,9	163,8	241,3	348,9	455,6	1,29	0,96	0,71	0,52
GL134	LB	9,91	21,5	30,3	42,8	60,3	116,8	166	217,9	286	2,25	1,65	1,21	0,89
GL135	LB	5,36	26	36,7	51,6	72,7	131,8	193	252,7	331,2	1,89	1,39	1,02	0,75
GL136	LB	8,81	22,3	31,4	44,3	62,5	119,7	170,9	224,2	294,2	2,18	1,6	1,17	0,86
GL137	LB	3,98	28,6	40,2	56,5	79,5	139,2	207,6	271,5	355,6	1,74	1,28	0,94	0,69
GL138	LB	6,21	24,9	35	49,3	69,5	128,2	186,2	243,9	319,8	1,97	1,45	1,06	0,78
GL139	LB	1,04	43,7	61	85,3	119,3	170	248,8	364,8	489,8	1,22	0,88	0,65	0,48
GL140	LB	7,45	23,5	33,1	46,7	65,8	123,7	178,1	233,4	306,2	2,08	1,52	1,12	0,82
GL141	LB	11,05	20,7	29,3	41,4	58,4	114,3	161,7	212,2	278,7	2,32	1,7	1,25	0,91
GL142	LB	5,42	25,9	36,5	51,4	72,4	131,5	192,4	252	330,2	1,9	1,39	1,03	0,75
GL143	LB	4,07	28,4	39,9	56,1	78,9	138,6	206,4	270	353,5	1,75	1,29	0,95	0,7
GL144	LB	6,36	24,7	34,8	49	69	127,6	185,1	242,5	317,9	1,98	1,46	1,07	0,79
GL144	LB	4,66	27,2	38,3	53,9	75,8	135,3	199,7	261,4	342,4	1,82	1,34	0,98	0,72
GL146	LB	8,44	22,6	31,8	44,9	63,4	120,7	172,7	226,5	297,2	2,15	1,58	1,16	0,85
GL147	LB	3,1	30,9	43,4	61	85,7	145,4	218,7	288,4	377,3	1,62	1,19	0,88	0,65
GL147	LB	9,4	21,8	30,8	43,5	61,3	118,1	168,2	220,7	289,6	2,22	1,63	1,19	0,88
GL147	LB	6	25,1	35,4	49,9	70,2	129	187,7	245,9	322,3	1,95	1,43	1,05	0,77

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
GL148	LB	3,49	29,8	41,9	58,8	82,7	142,5	214,3	280,2	366,8	1,67	1,23	0,91	0,67
GL149	LB	2,38	33,6	47,2	66,2	92,9	151,8	226,7	307,4	401,9	1,5	1,11	0,82	0,6
GL150	LB	4,24	28	39,4	55,5	78	137,7	204,4	267,4	350,2	1,77	1,3	0,96	0,7
GL152	LB	5,17	26,3	37,1	52,2	73,5	132,7	194,7	254,9	334	1,87	1,38	1,01	0,74
GL154	LB	2,2	34,4	48,3	67,7	95	153,6	228,9	313,1	409,3	1,47	1,08	0,8	0,59
GL154	LB	4,79	27	37,9	53,4	75,2	134,6	198,3	259,6	340,1	1,83	1,35	0,99	0,73
GL154	LB	5,96	25,2	35,5	50	70,4	129,2	188	246,3	322,8	1,95	1,43	1,05	0,77
GL157	LB	8,6	22,4	31,7	44,7	63	120,2	171,9	225,5	295,9	2,16	1,59	1,16	0,85
GL157	LB	7,95	23	32,4	45,7	64,5	122,1	175,2	229,8	301,4	2,11	1,55	1,14	0,84
GL157	LB	9,31	21,9	30,9	43,6	61,5	118,3	168,6	221,2	290,3	2,21	1,62	1,19	0,87
GL157	LB	6,81	24,1	34	48	67,6	125,9	182	238,5	312,8	2,02	1,49	1,09	0,8
GL157	LB	9,07	22,1	31,1	43,9	62	119	169,7	222,6	292,1	2,2	1,61	1,18	0,87
GL157	LB	5,95	25,2	35,5	50	70,4	129,3	188,1	246,4	323	1,95	1,43	1,05	0,77
GL157	LB	8,31	22,7	32	45,1	63,6	121,1	173,3	227,3	298,2	2,14	1,57	1,15	0,85
GL160	LB	5,61	25,7	36,1	50,9	71,7	130,7	190,8	249,9	327,5	1,92	1,41	1,04	0,76
GL162	LB	6,98	24	33,8	47,6	67,1	125,3	180,9	237,1	311	2,04	1,5	1,1	0,81
GL167	LB	7,52	23,4	33	46,5	65,6	123,5	177,6	232,9	305,5	2,08	1,53	1,12	0,82
GL168	LB	2,25	34,2	48	67,3	94,4	153,1	228,3	311,5	407,2	1,48	1,09	0,81	0,59
GL200	LB	4,17	28,2	39,6	55,7	78,4	138,1	205,2	268,5	351,6	1,76	1,3	0,95	0,7
B1L34	RM	3,01	31,2	43,8	61,6	86,5	146,1	219,6	290,4	379,9	1,61	1,18	0,87	0,64
B1L35	RM	4,81	26,9	37,9	53,4	75,1	134,5	198,2	259,4	339,9	1,83	1,35	0,99	0,73
B1L36	RM	3,74	29,2	41	57,6	81	140,8	210,7	275,6	360,8	1,71	1,26	0,93	0,68
B1L38	RM	12,49	19,9	28,2	39,8	56,3	111,4	156,9	206,1	270,6	2,4	1,76	1,29	0,95
CL10	RM	5,37	26	36,6	51,6	72,6	131,8	192,8	252,5	330,9	1,89	1,39	1,02	0,75
CL12	RM	16,85	18,1	25,7	36,4	51,4	104,7	145,8	191,7	252	2,62	1,91	1,4	1,03
CL13	RM	13,27	19,6	27,7	39,1	55,3	110,1	154,6	203,1	266,8	2,45	1,79	1,31	0,96
CL14	RM	8,06	22,9	32,3	45,6	64,2	121,8	174,6	229	300,4	2,12	1,56	1,14	0,84
CL15	RM	18,35	17,7	25	35,4	50,1	102,8	142,8	187,8	247	2,68	1,96	1,43	1,05
CL16	RM	2,51	33,1	46,4	65,1	91,4	150,6	225,1	303,4	396,8	1,52	1,12	0,83	0,61
CL17	RM	1	44,2	61,7	86,2	120,6	170,7	249,7	365,8	494	1,21	0,87	0,64	0,48
CL18	RM	3,35	30,2	42,4	59,6	83,8	143,5	216,4	283,1	370,5	1,65	1,22	0,9	0,66

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
CL19	RM	2,07	35,1	49,2	69	96,8	155,1	230,7	317,8	415,4	1,44	1,07	0,79	0,58
CL2	RM	9,79	21,5	30,4	42,9	60,6	117,1	166,5	218,5	286,8	2,24	1,64	1,21	0,88
CL20	RM	1,99	35,6	49,8	69,8	98	156	231,8	320,7	419,2	1,43	1,05	0,78	0,57
CL21	RM	2,15	34,7	48,7	68,2	95,7	154,2	229,6	314,8	411,6	1,46	1,08	0,8	0,59
CL22	RM	0,69	48,7	69,2	96,5	134,8	177,1	257,4	374,8	539,2	1,16	0,79	0,58	0,43
CL23	RM	2,25	34,2	48	67,3	94,4	153,1	228,3	311,5	407,2	1,48	1,09	0,81	0,59
CL25	RM	3,07	31	43,6	61,2	86	145,6	219	289	378,1	1,61	1,19	0,88	0,65
CL26	RM	3,04	31,1	43,7	61,4	86,3	145,9	219,3	289,7	379,1	1,61	1,19	0,87	0,64
CL27	RM	1,75	37,1	51,9	72,7	102	159	235,5	331,1	432,6	1,38	1,02	0,75	0,55
CL28	RM	2,98	31,3	44	61,7	86,7	146,4	219,9	291,1	380,8	1,6	1,18	0,87	0,64
CL29	RM	3,72	29,2	41,1	57,7	81,1	140,9	211	275,9	361,3	1,7	1,26	0,92	0,68
CL3	RM	16,85	18,2	25,7	36,4	51,4	104,7	145,8	191,7	252	2,62	1,91	1,4	1,03
CL31	RM	1	44,2	61,7	86,2	120,6	170,7	249,7	365,8	494,1	1,21	0,87	0,64	0,48
CL32	RM	2,49	33,1	46,5	65,2	91,5	150,7	225,2	303,8	397,3	1,52	1,12	0,83	0,61
CL33	RM	1,62	37,9	53,1	74,4	104,3	160,7	237,5	337,1	440,3	1,35	1	0,74	0,54
DL1	RMC	5,5	25,8	36,4	51,2	72,1	131,2	191,8	251,2	329,1	1,9	1,4	1,03	0,76
DL10	RMC	23,84	16,3	23,1	32,7	46,3	97,2	134	176,3	232	2,89	2,11	1,54	1,13
DL104	RMC	12,9	19,7	27,9	39,5	55,7	110,7	155,7	204,5	268,6	2,43	1,78	1,3	0,95
DL105	RMC	8,6	22,4	31,7	44,7	63	120,2	171,9	225,5	295,8	2,16	1,59	1,16	0,85
DL106	RMC	34,88	14,4	20,5	29,1	41,3	89,6	122,1	160,9	211,9	3,22	2,34	1,71	1,25
DL107	RMC	16,32	18,3	25,9	36,7	51,9	105,4	147	193,2	254	2,59	1,9	1,39	1,02
DL108	RMC	8,63	22,4	31,6	44,6	62,9	120,1	171,7	225,3	295,6	2,16	1,59	1,17	0,86
DL109	RMC	19,82	17,2	24,4	34,6	49	101,2	140,2	184,4	242,5	2,74	2	1,46	1,07
DL112	RMC	11,8	20,3	28,7	40,5	57,3	112,8	159,1	208,9	274,4	2,37	1,73	1,27	0,93
DL113	RMC	1,63	37,9	53,1	74,3	104,1	160,6	237,4	336,7	439,9	1,35	1	0,74	0,54
DL115	RMC	3,82	29	40,7	57,3	80,5	140,3	209,7	274,3	359,1	1,72	1,26	0,93	0,69
DL116	RMC	4,8	27	37,9	53,4	75,1	134,6	198,2	259,5	340	1,83	1,35	0,99	0,73
DL117	RMC	28,2	15,4	21,9	31,1	44	93,8	128,6	169,4	222,9	3,03	2,21	1,61	1,18
DL118	RMC	5,66	25,6	36	50,8	71,5	130,5	190,4	249,4	326,9	1,92	1,41	1,04	0,76
DL119	RMC	14,15	19,2	27,1	38,4	54,2	108,6	152,2	200	262,8	2,49	1,82	1,33	0,98
DL12	RMC	23,53	16,3	23,2	32,8	46,5	97,5	134,4	176,9	232,8	2,88	2,1	1,53	1,12

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
DL120	RMC	2,63	32,6	45,7	64,2	90,1	149,4	223,7	300,1	392,4	1,54	1,14	0,84	0,62
DL121	RMC	9	22,1	31,2	44	62,1	119,1	170	223	292,7	2,19	1,61	1,18	0,86
DL122	RMC	9,38	21,8	30,8	43,5	61,4	118,2	168,3	220,8	289,8	2,22	1,62	1,19	0,87
DL123	RMC	11,51	20,5	28,9	40,9	57,7	113,3	160,1	210,2	276	2,35	1,72	1,26	0,92
DL124	RMC	40,81	13,7	19,5	27,7	39,4	86,6	117,5	154,9	204,1	3,36	2,45	1,78	1,3
DL125	RMC	11,12	20,7	29,2	41,3	58,3	114,1	161,4	211,9	278,3	2,33	1,7	1,25	0,92
DL126	RMC	9,65	21,6	30,5	43,1	60,8	117,5	167,1	219,3	287,8	2,23	1,64	1,2	0,88
DL127	RMC	15,03	18,8	26,6	37,7	53,2	107,2	150	197,1	259	2,53	1,85	1,36	0,99
DL128	RMC	15,96	18,5	26,1	37	52,3	105,9	147,8	194,3	255,3	2,58	1,88	1,38	1,01
DL129	RMC	4,98	26,7	37,5	52,8	74,3	133,7	196,5	257,3	337,1	1,85	1,36	1	0,74
DL13	RMC	9,88	21,5	30,3	42,8	60,4	116,9	166,2	218,1	286,2	2,25	1,65	1,21	0,89
DL130	RMC	4,37	27,8	39	54,9	77,3	136,9	202,8	265,4	347,6	1,78	1,31	0,97	0,71
DL14	RMC	8,6	22,4	31,7	44,7	63	120,3	171,9	225,5	295,9	2,16	1,59	1,16	0,85
DL15	RMC	5,59	25,7	36,2	50,9	71,7	130,8	191	250,1	327,8	1,91	1,41	1,03	0,76
DL16	RMC	38,03	14	20	28,3	40,2	87,9	119,5	157,6	207,6	3,3	2,4	1,75	1,28
DL17	RMC	11,61	20,4	28,8	40,7	57,5	113,1	159,7	209,7	275,4	2,35	1,72	1,26	0,93
DL19	RMC	4,6	27,3	38,4	54,1	76,1	135,6	200,3	262,2	343,4	1,81	1,33	0,98	0,72
DL2	RMC	1,98	35,6	49,9	70	98,2	156,2	232	321,3	419,9	1,42	1,05	0,78	0,57
DL22	RMC	22,06	16,7	23,6	33,5	47,4	98,9	136,5	179,7	236,4	2,83	2,06	1,51	1,1
DL23	RMC	7,12	23,8	33,6	47,3	66,7	124,8	180	236	309,5	2,05	1,5	1,1	0,81
DL24	RMC	7,68	23,2	32,8	46,2	65,2	123	176,7	231,7	303,9	2,09	1,54	1,13	0,83
DL25	RMC	10,87	20,8	29,4	41,6	58,7	114,7	162,3	213,1	279,8	2,31	1,69	1,24	0,91
DL26	RMC	12,02	20,2	28,5	40,3	56,9	112,3	158,4	208	273,2	2,38	1,74	1,28	0,94
DL27	RMC	16,94	18,1	25,6	36,3	51,3	104,6	145,6	191,5	251,7	2,62	1,92	1,4	1,03
DL3	RMC	12,77	19,8	28	39,6	55,9	110,9	156,1	205	269,3	2,42	1,77	1,3	0,95
DL30	RMC	11,51	20,5	28,9	40,8	57,7	113,3	160,1	210,2	276	2,35	1,72	1,26	0,92
DL32	RMC	1,16	42,1	58,9	82,4	115,3	167,8	246,1	361,7	476,8	1,24	0,91	0,67	0,5
DL35	RMC	0,65	49,1	70,7	98,6	137,7	178,3	258,8	376,3	548,5	1,15	0,77	0,57	0,42
DL36	RMC	1,25	41,2	57,6	80,6	112,9	166,3	244,4	359,1	468,7	1,25	0,93	0,68	0,51
DL37	RMC	0,99	44,3	61,9	86,5	121	170,9	249,9	366,1	495,3	1,21	0,87	0,64	0,48
DL38	RMC	1,07	43,2	60,3	84,3	118	169,3	248	363,8	485,6	1,22	0,89	0,66	0,49

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
DL39	RMC	0,86	46,3	64,7	90,3	126,2	173,5	253	369,7	512,1	1,19	0,83	0,62	0,46
DL40	RMC	4	28,5	40,1	56,4	79,4	139,1	207,3	271,2	355	1,74	1,28	0,94	0,69
DL41	RMC	8	22,9	32,4	45,7	64,4	122	175	229,4	301	2,12	1,55	1,14	0,84
DL42	RMC	8,42	22,6	31,9	45	63,4	120,8	172,8	226,6	297,4	2,15	1,58	1,16	0,85
DL43	RMC	6,48	24,5	34,6	48,7	68,6	127,1	184,2	241,4	316,5	2	1,47	1,08	0,79
DL44	RMC	11,04	20,7	29,3	41,4	58,4	114,3	161,7	212,3	278,8	2,32	1,7	1,25	0,91
DL45	RMC	8	22,9	32,4	45,7	64,4	122	175	229,4	301	2,12	1,55	1,14	0,84
DL47	RMC	30,3	15,1	21,4	30,4	43,1	92,4	126,3	166,4	219,1	3,09	2,25	1,64	1,2
DL48	RMC	13,25	19,6	27,7	39,1	55,3	110,1	154,6	203,2	266,9	2,44	1,79	1,31	0,96
DL49	RMC	1,59	38,2	53,4	74,8	104,8	161,1	238	338,6	442,3	1,34	0,99	0,73	0,54
DL5	RMC	1,2	41,7	58,3	81,5	114,1	167,1	245,3	360,7	472,9	1,24	0,92	0,68	0,5
DL50	RMC	2,84	31,8	44,6	62,7	88	147,5	221,3	294,4	385,2	1,58	1,16	0,86	0,63
DL51	RMC	7	23,9	33,7	47,6	67	125,2	180,8	236,9	310,7	2,04	1,5	1,1	0,81
DL52	RMC	3,01	31,2	43,8	61,6	86,5	146,1	219,6	290,4	379,9	1,61	1,18	0,87	0,64
DL53	RMC	51,13	12,8	18,2	25,9	36,8	82,4	111,2	146,7	193,5	3,59	2,61	1,9	1,39
DL54	RMC	67,12	11,7	16,7	23,8	33,9	77,6	104	137,4	181,3	3,87	2,81	2,05	1,49
DL55	RMC	95,22	10,5	15	21,4	30,5	71,9	95,5	126,3	166,8	4,28	3,1	2,25	1,64
DL56	RMC	34,63	14,5	20,5	29,2	41,4	89,7	122,3	161,2	212,3	3,21	2,34	1,71	1,25
DL57	RMC	67,72	11,7	16,7	23,8	33,8	77,5	103,8	137,1	180,9	3,88	2,82	2,05	1,5
DL6	RMC	6,86	24,1	34	47,9	67,4	125,7	181,7	238,1	312,2	2,03	1,49	1,09	0,8
DL60	RMC	82,35	11	15,7	22,4	31,9	74,2	98,9	130,8	172,7	4,11	2,98	2,16	1,58
DL61	RMC	32,19	14,8	21	29,8	42,3	91,1	124,5	164	216	3,14	2,29	1,67	1,22
DL62	RMC	6,92	24	33,9	47,7	67,3	125,5	181,3	237,6	311,6	2,03	1,49	1,1	0,81
DL65	RMC	154,21	9	12,9	18,5	26,4	64,1	84,9	112,5	148,7	4,91	3,55	2,57	1,87
DL66	RMC	41,75	13,6	19,4	27,5	39,1	86,1	116,8	154,1	203	3,39	2,46	1,8	1,31
DL67	RMC	12,07	20,2	28,5	40,3	56,9	112,2	158,2	207,8	272,9	2,38	1,74	1,28	0,94
DL68	RMC	59,66	12,2	17,4	24,7	35,1	79,7	107,1	141,4	186,5	3,75	2,72	1,98	1,44
DL69	RMC	53,33	12,6	18	25,6	36,3	81,7	110	145,2	191,5	3,63	2,64	1,92	1,4
DL7	RMC	3,24	30,5	42,9	60,2	84,6	144,3	217,4	285,3	373,4	1,64	1,21	0,89	0,66
DL70	RMC	34,15	14,5	20,6	29,3	41,5	90	122,7	161,7	213	3,2	2,33	1,7	1,24
DL71	RMC	20,46	17,1	24,2	34,3	48,5	100,5	139,1	183	240,6	2,77	2,02	1,48	1,08

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
DL72	RMC	26,12	15,8	22,4	31,8	45	95,4	131	172,5	227	2,96	2,16	1,58	1,15
DL73	RMC	10,47	21,1	29,8	42	59,4	115,5	163,8	215	282,3	2,29	1,68	1,23	0,9
DL74	RMC	38,48	14	19,9	28,2	40,1	87,7	119,2	157,1	207	3,31	2,41	1,76	1,28
DL75	RMC	23,76	16,3	23,1	32,7	46,4	97,3	134,1	176,5	232,2	2,89	2,11	1,54	1,13
DL76	RMC	29,24	15,3	21,7	30,7	43,5	93,1	127,4	167,9	221	3,06	2,23	1,63	1,19
DL77	RMC	20,21	17,1	24,3	34,4	48,7	100,7	139,5	183,5	241,3	2,76	2,01	1,47	1,08
DL79	RMC	6,62	24,4	34,3	48,4	68,2	126,6	183,2	240,1	314,8	2,01	1,47	1,08	0,8
DL8	RMC	3,35	30,2	42,4	59,6	83,8	143,5	216,3	283	370,4	1,65	1,22	0,9	0,66
DL81	RMC	27,41	15,6	22,1	31,3	44,4	94,4	129,5	170,5	224,4	3	2,19	1,6	1,17
DL82	RMC	24,67	16,1	22,8	32,4	45,8	96,5	132,9	174,9	230,1	2,92	2,13	1,55	1,14
DL83	RMC	10,77	20,9	29,5	41,7	58,9	114,9	162,7	213,5	280,4	2,31	1,69	1,24	0,91
DL86	RMC	4,82	26,9	37,9	53,3	75	134,5	198	259,2	339,6	1,83	1,35	0,99	0,73
DL87	RMC	21,93	16,7	23,7	33,5	47,5	99	136,7	179,9	236,7	2,82	2,06	1,5	1,1
DL88	RMC	24,22	16,2	23	32,5	46,1	96,9	133,5	175,7	231,2	2,9	2,12	1,55	1,13
DL89	RMC	30,8	15	21,3	30,2	42,9	92	125,8	165,8	218,3	3,11	2,26	1,65	1,21
DL9	RMC	1,29	40,8	57	79,8	111,7	165,6	243,5	356,2	464,9	1,26	0,93	0,69	0,51
DL90	RMC	30,51	15,1	21,4	30,3	43	92,2	126,1	166,2	218,8	3,1	2,26	1,65	1,2
DL91	RMC	23,59	16,3	23,1	32,8	46,5	97,5	134,3	176,8	232,6	2,88	2,1	1,54	1,12
DL92	RMC	11,68	20,4	28,8	40,7	57,4	113	159,5	209,5	275,1	2,36	1,73	1,27	0,93
DL93	RMC	18,5	17,6	25	35,3	50	102,6	142,5	187,5	246,5	2,69	1,96	1,44	1,05
DL94	RMC	12,9	19,7	27,9	39,5	55,7	110,7	155,7	204,5	268,6	2,43	1,78	1,3	0,95
DL95	RMC	46,26	13,2	18,8	26,7	37,9	84,2	113,9	150,3	198,1	3,49	2,53	1,85	1,35
DL96	RMC	9,37	21,8	30,8	43,5	61,4	118,2	168,3	220,8	289,8	2,22	1,62	1,19	0,87
EL131	RMC	48,07	13	18,6	26,4	37,5	83,5	112,9	148,9	196,3	3,52	2,56	1,87	1,36
EL132	RMC	8,16	22,8	32,2	45,4	64	121,5	174,1	228,3	299,6	2,13	1,56	1,15	0,84
EL133	RMC	21,7	16,8	23,7	33,6	47,6	99,2	137,1	180,4	237,3	2,81	2,05	1,5	1,1
EL134	RMC	22,65	16,5	23,4	33,2	47	98,3	135,7	178,5	234,9	2,85	2,08	1,52	1,11
EL135	RMC	13,8	19,3	27,3	38,6	54,6	109,2	153,1	201,2	264,3	2,47	1,81	1,33	0,97
L140	RMC	7,22	23,7	33,4	47,1	66,4	124,5	179,4	235,2	308,4	2,06	1,51	1,11	0,81
HL01	SN	0,29	53,2	89,6	126,2	175,6	188,3	270,8	389,9	562,9	1,07	0,69	0,46	0,34
HL02	SN	9,57	21,7	30,6	43,2	61	117,7	167,5	219,7	288,4	2,23	1,63	1,2	0,88

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
HL03	SN	4,39	27,7	39	54,9	77,2	136,8	202,7	265,2	347,3	1,79	1,31	0,97	0,71
HL04	SN	7,77	23,2	32,7	46,1	64,9	122,7	176,2	231	303	2,1	1,54	1,13	0,83
HL05	SN	8,77	22,3	31,5	44,4	62,6	119,8	171,1	224,4	294,5	2,17	1,59	1,17	0,86
HL06	SN	0,98	44,4	62	86,7	121,3	171	250	366,3	496,1	1,21	0,87	0,64	0,47
HL07	SN	0,8	47,3	66	92,2	128,8	174,7	254,4	371,3	520,4	1,18	0,82	0,61	0,45
HL07	SN	0,79	47,5	66,3	92,5	129,3	174,9	254,7	371,6	521,9	1,17	0,82	0,61	0,45
HL07	SN	0,8	47,5	66,2	92,5	129,2	174,8	254,7	371,6	521,7	1,17	0,82	0,61	0,45
HL08	SN	0,81	47,3	66	92,1	128,7	174,6	254,4	371,2	520	1,18	0,82	0,61	0,45
HL10	SN	1	44,2	61,7	86,2	120,6	170,7	249,6	365,8	494	1,21	0,87	0,64	0,48
HL11	SN	1	44,2	61,7	86,2	120,6	170,7	249,7	365,8	494	1,21	0,87	0,64	0,48
HL12	SN	1,46	39,2	54,9	76,9	107,7	163	240,4	345,9	451,7	1,31	0,97	0,71	0,53
HL13	SN	1	44,2	61,7	86,2	120,6	170,7	249,7	365,8	494	1,21	0,87	0,64	0,48
HL14	SN	2,5	33,1	46,4	65,2	91,5	150,6	225,2	303,7	397,1	1,52	1,12	0,83	0,61
HL15	SN	6,22	24,8	35	49,3	69,5	128,1	186,1	243,8	319,6	1,97	1,45	1,06	0,78
HL16	SN	6,13	25	35,2	49,5	69,8	128,5	186,8	244,7	320,8	1,96	1,44	1,06	0,78
HL17	SN	12,27	20,1	28,3	40,1	56,6	111,9	157,6	207	271,8	2,39	1,75	1,28	0,94
HL17	SN	3,5	29,8	41,8	58,8	82,6	142,4	214,2	280	366,5	1,68	1,23	0,91	0,67
HL17	SN	0,55	50,1	74,3	103,5	144,5	180,7	261,7	379,6	551,9	1,13	0,74	0,55	0,41
HL18	SN	3,1	30,9	43,4	61	85,7	145,4	218,7	288,2	377,1	1,62	1,19	0,88	0,65
HL19	SN	3,03	31,2	43,8	61,5	86,4	146	219,4	290	379,5	1,61	1,18	0,87	0,64
HL20	SN	3	31,3	43,9	61,6	86,6	146,2	219,7	290,6	380,2	1,6	1,18	0,87	0,64
HL21	SN	5	26,6	37,5	52,7	74,2	133,5	196,3	257	336,7	1,85	1,36	1	0,74
HL22	SN	2,26	34,2	47,9	67,2	94,3	153	228,1	311	406,6	1,48	1,09	0,81	0,59
HL23	SN	3,09	31	43,5	61,1	85,8	145,5	218,8	288,6	377,6	1,62	1,19	0,88	0,65
HL24	SN	4,89	26,8	37,7	53,1	74,7	134,1	197,3	258,3	338,5	1,84	1,35	1	0,73
HL25	SN	4	28,5	40,1	56,4	79,4	139,1	207,3	271,2	355	1,74	1,28	0,94	0,69
HL26	SN	3	31,3	43,9	61,6	86,6	146,2	219,7	290,6	380,2	1,6	1,18	0,87	0,64
HL27	SN	3	31,3	43,9	61,6	86,6	146,2	219,7	290,7	380,3	1,6	1,18	0,87	0,64
HL27	SN	2,98	31,3	44	61,7	86,7	146,3	219,9	291	380,7	1,6	1,18	0,87	0,64
HL27	SN	2,9	31,6	44,3	62,2	87,4	147	220,7	292,9	383,2	1,59	1,17	0,86	0,64
HL28	SN	7,9	23	32,5	45,8	64,6	122,3	175,5	230,1	301,9	2,11	1,55	1,14	0,83

Code Lac	Bassin	Profondeur moyenne théorique	Phosphore total (en µg de Phosphore / l)				Ammonium (en µg d'Ammonium / l)				Secchi (en mètre)			
			TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me	TB	B	Mo	Me
HL40	SN	11,7	20,4	28,8	40,6	57,4	113	159,4	209,3	274,9	2,36	1,73	1,27	0,93
HL55	SN	5,97	25,2	35,4	49,9	70,3	129,2	187,9	246,2	322,7	1,95	1,43	1,05	0,77
HL56	SN	5,84	25,3	35,7	50,3	70,8	129,7	188,9	247,5	324,4	1,94	1,42	1,05	0,77
HL57	SN	9,1	22	31,1	43,9	61,9	118,9	169,5	222,4	291,9	2,2	1,61	1,18	0,87
HL59	SN	4,98	26,6	37,5	52,8	74,3	133,6	196,4	257,2	336,9	1,85	1,36	1	0,74
HL60	SN	8,97	22,1	31,2	44,1	62,2	119,2	170,1	223,2	292,9	2,19	1,6	1,18	0,86
HL61	SN	11,08	20,7	29,3	41,3	58,4	114,2	161,6	212,1	278,5	2,32	1,7	1,25	0,91
HL62	SN	3,47	29,9	42	59	82,9	142,6	214,7	280,7	367,4	1,67	1,23	0,91	0,67
HL63	SN	11,02	20,7	29,3	41,4	58,5	114,4	161,8	212,4	278,9	2,32	1,7	1,25	0,91
HL63	SN	9,18	22	31	43,8	61,8	118,7	169,2	221,9	291,3	2,2	1,61	1,18	0,87
HL65	SN	14,3	19,1	27	38,2	54	108,4	151,8	199,5	262,1	2,5	1,83	1,34	0,98
HL66	SN	5,88	25,3	35,6	50,2	70,7	129,5	188,7	247,2	324	1,94	1,43	1,05	0,77
HL67	SN	6,6	24,4	34,4	48,4	68,3	126,7	183,4	240,4	315,2	2,01	1,47	1,08	0,79
HL68	SN	15,27	18,7	26,5	37,5	53	106,9	149,4	196,3	258	2,54	1,86	1,36	1
HL69	SN	2,09	35	49,1	68,8	96,6	154,9	230,4	317,1	414,5	1,45	1,07	0,79	0,58
HL70	SN	4,39	27,7	39	54,9	77,2	136,8	202,7	265,2	347,3	1,79	1,31	0,97	0,71
HL71	SN	7,16	23,8	33,5	47,2	66,6	124,7	179,7	235,6	309	2,05	1,51	1,11	0,81

ANNEXE 9 : PRISE EN COMPTE DE LA VARIABILITÉ SPATIALE ET RÈGLES D'EXTRAPOLATION SPATIALE

La présente annexe rappelle les principes généraux et les règles à appliquer pour évaluer l'état écologique de l'ensemble des masses d'eau, tels que définis à l'annexe 10 de l'arrêté évaluation. Ils sont à décliner par bassin, au regard de leurs spécificités (contexte géographique, usages, etc.) et des outils disponibles.

Les principes énoncés ci-dessous peuvent se combiner. Ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et s'appliquent selon la disponibilité des données et des outils, l'objectif étant d'aboutir à l'évaluation la plus fine possible de l'état écologique d'une masse d'eau, en exploitant au mieux l'ensemble des données disponibles.

Il existe deux types de données exploitables :

- **les données milieu** : il peut s'agir des données des compartiments biologiques (invertébrés benthiques, diatomées, poissons, phytoplancton, etc.), des données physico-chimiques ou chimiques (concentration en oxygène, en phosphore, etc.) ;
- **les données dites de pression** : il peut s'agir par exemple de rejets d'un site industriel ou d'un obstacle de type barrage (voir les exemples de typologie des pressions, proposés au point 2.iii de la présente annexe).

Un niveau de confiance sera attribué à l'état écologique évalué pour chaque masse d'eau, il dépendra des principes explicités en annexe 10.

1. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau suivies directement

Lorsqu'une masse d'eau est munie d'un ou plusieurs sites de suivi représentatifs de l'état de la masse d'eau, la classe d'état écologique de la masse d'eau est déterminée par la classe d'état la plus basse de ces sites. Ce sont les seuls cas pour lesquels il est envisageable de disposer de toutes les données milieu pertinentes pour l'évaluation de l'état écologique.

Les critères permettant d'identifier un **site représentatif de l'état d'une masse d'eau** sont définis par l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010 (annexe 9, §1). Un tel site doit être représentatif de l'état de la masse d'eau dans son ensemble, vis-à-vis de sa typologie naturelle²⁹ et de l'incidence des pressions anthropiques qui s'y exercent. L'état évalué doit en effet refléter la situation dominante observée à l'échelle de la masse d'eau, et non pas les incidences locales de pressions sans incidence sur le fonctionnement global de la masse d'eau.

Par ailleurs, les sites localisés sur une masse d'eau située en amont ou en aval d'une masse d'eau donnée peuvent être utilisés pour établir l'état de cette dernière, dès lors qu'ils sont considérés comme représentatifs de son état.

²⁹ Les critères de la typologie nationale des cours d'eau sont fondés sur la régionalisation des écosystèmes aquatiques par **hydro-éco-régions** (selon des critères de relief, de géologie et de climat du bassin versant) croisée avec des classes de **tailles** de cours d'eau. Ils sont précisés dans **l'arrêté du 12 janvier 2010** relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux, prévu à l'article R 212-5 du code de l'environnement.

Dans le **cas d'une masse d'eau étendue** soumise à des pressions importantes de nature différente ou à plusieurs pressions ponctuelles distantes, plusieurs sites de suivi peuvent être nécessaires pour assurer la représentativité de l'état de la masse d'eau.

Dans ce cas, la classe d'état écologique de la masse d'eau est déterminée par la classe d'état la plus basse des différents sites (principe du site déclassant par analogie avec le principe de l'élément déclassant).

Ces données fournissent une évaluation en dur de l'état de la masse d'eau, sous réserve toutefois de s'assurer que les résultats de la surveillance sont basés sur des chroniques de données suffisamment représentatives de l'état de la masse d'eau (représentativité du site vis-à-vis de la masse d'eau et des pressions qui s'y exercent, volume de données, éléments de qualité disponibles, etc.). A défaut, il conviendra de tenir compte également du dire d'expert et des informations disponibles sur les pressions et leurs incidences pour statuer sur l'état de la masse d'eau.

2. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau non suivies directement

Dans le cas de masses d'eau ne disposant pas de tels sites représentatifs, l'évaluation de l'état écologique nécessite de recourir au croisement des données de pressions avec les données milieux disponibles ainsi que des données et modèles d'extrapolation spatiale.

I. Utilisation d'outils de modélisation

Il est en particulier possible d'estimer l'état des éléments ou paramètres physico-chimiques soutenant la biologie (macropolluants) par l'utilisation d'un outil de **modélisation** mécanique/déterministe reconnu et validé.

D'autres modèles d'extrapolation spatiale peuvent être utilisés (outil d'aide à l'extrapolation spatiale d'IRSTEA pour la biologie des cours d'eau, certains outils nationaux identifiés dans le recueil de méthodologies de caractérisation des pressions permettant d'identifier une dégradation quantifiable sur les paramètres de l'état DCE, outils de modélisation des bassins), à condition qu'ils soient reconnus et validés. Les résultats issus de modèles sont à considérer avec précaution et nécessiteront en tout état de cause une validation des résultats par expertise et confrontation avec la connaissance des pressions et de leurs incidences.

Il est à noter que les outils de modélisation ne sont généralement pas conçus pour prendre en compte toutes les pressions. Il est donc nécessaire de croiser les données issues de ces modèles avec les données disponibles relatives à l'ensemble des types de **pressions**, en particulier relatives aux **pollutions**, ponctuelles et diffuses, et aux altérations **hydromorphologiques**.

II. Regroupement de masses d'eau dans des contextes similaires

C'est le cas des masses d'eau non suivies directement mais qui font partie d'un groupe homogène de masses d'eau présentant un contexte similaire du point de vue de la typologie et des pressions qui s'y exercent. Un échantillon de masses d'eau est suivi directement.

Contrairement aux deux premiers cas, l'état de chacune des masses d'eau n'est pas directement évalué avec des données milieux, mais il est estimé, par assimilation, à partir de l'état obtenu avec des données milieux sur des masses d'eau situées dans un contexte similaire.

➔ L'état écologique de chaque masse d'eau suivie directement dans le groupe est évalué selon les principes énoncés dans le présent guide. La proportion de masses d'eau dans chaque classe d'état écologique est calculée. L'état écologique de l'ensemble des masses d'eau non suivies du groupe homogène pourra être déterminé par la classe d'état écologique dominante, tout en tenant compte des informations disponibles par ailleurs, par exemple en matière de pressions.

Exemple : en considérant un groupe homogène composé de 100 de masses d'eau :

- ❑ *suivi direct de 50 masses d'eau et évaluation de l'état de ces 50 masses d'eau ;*
- ❑ *sur ces 50 masses d'eau : 10 % en très bon état, 20 % en bon état et 70 % en état moyen ;*
- ❑ *en l'absence d'autres informations par exemple sur les pressions, l'état attribué aux masses d'eau non suivies est moyen.*

On pourra également estimer l'état écologique de masses d'eau à partir des connaissances des forces motrices et de l'état d'autres masses d'eau dans des contextes similaires en s'appuyant sur des modèles statistiques d'extrapolation spatiale (modèles reliant les indices biologiques aux forces motrices - IBGN et occupation du sol par exemple).

III. Utilisation de données pression

➔ **En l'absence de données milieux suffisantes** pour attribuer un état à une masse d'eau sur la base de données milieux et dans le cas où **il existe des données pressions suffisamment fiables** pour estimer le(s) type(s) de pressions qui s'exercent sur la masse d'eau, l'état écologique peut être évalué sur la base des données pressions.

Les données pressions à prendre en compte sont notamment celles utilisées pour la mise à jour des états des lieux et l'élaboration des SDAGE et.

Pour suivre cette démarche, les pressions doivent être caractérisées par grand type, suivant leur nature ou leur origine. A titre indicatif, les **typologies** présentées ci-dessous pourront être utilisées :

Exemple 1 :

- *pression de pollution d'origine domestique ou industrielle (dominante matière organiques et oxydables, ou toxiques hors pesticides) ;*
- *pression de pollution d'origine agricole ;*
- *pression de nature hydrologique ou morphologique.*

Exemple 2 :

- *pression de pollution ponctuelle (dominante matière organiques et oxydables),*
- *pression de pollution diffuse (dominante agricole ou ponctuelle dispersée, hors pesticides) ;*
- *pression de pollution par les pesticides ;*
- *pression (hydro)morphologique ;*
- *pression quantitative (prélèvements, dérivations, transferts ...).*

La relation pression-état est appréciée en fonction du nombre de types de pressions identifiés sur la masse d'eau et le cas échéant de leur intensité, en suivant les principes énoncés ci-dessous :

- un état écologique très bon ou bon peut être attribué à une masse d'eau à la condition qu'aucune pression significative n'ait été identifiée sur cette masse d'eau ;
- un état écologique médiocre ou mauvais sera attribué à une masse d'eau soumise :
 - soit à tous ou presque tous les types de pressions possibles,
 - soit à au moins une pression identifiée comme forte ou très forte ;
- un état écologique moyen sera attribué dans les autres cas.

Le tableau présenté ci-dessous illustre l'attribution d'un état écologique sur la base du nombre de types de pressions s'exerçant sur une masse d'eau en utilisant la typologie de l'exemple 2 et sans prendre en compte l'intensité des pressions.

Nombre de types de pressions s'exerçant sur la ME	État écologique proposé
0	Très bon ou Bon
1 & 2	Moyen*
3	Moyen*
4	Moyen*
5 & 6	Médiocre ou Mauvais*

* L'intensité de la pression peut évidemment conduire à adapter cette proposition d'attribution d'un état écologique

3. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau pour lesquelles il n'y a aucune information

➔ L'information est insuffisante pour attribuer un état écologique à la masse d'eau.

ANNEXE 10 : MODALITÉS D'ATTRIBUTION D'UN NIVEAU DE CONFIANCE À L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE ÉVALUÉ D'UNE MASSE D'EAU – COURS D'EAU OU PLAN D'EAU

L'objet de la présente annexe est de définir les principes généraux applicables pour l'attribution d'un niveau de confiance à l'état écologique évalué pour une masse d'eau, selon les règles énoncées dans l'annexe 11 de l'arrêté évaluation.

Ils sont résumés dans l'arbre de décision présenté ci-après.

Le niveau de confiance est déterminé **globalement pour l'état écologique attribué à une masse d'eau**, tout élément de qualité confondu et non, élément de qualité par élément de qualité.

Trois niveaux de confiance sont possibles : **3 (élevé), 2 (moyen), 1 (faible)**.

L'état écologique évalué pour une masse d'eau peut être le résultat de la combinaison de différents types et niveaux d'informations (données milieux, données pression, données de contexte similaire). Le niveau de confiance attribué est celui considéré comme le plus pertinent au regard des informations utilisées pour l'évaluation.

Les **éléments de qualité pertinents** de la masse d'eau sont ceux précisés dans la circulaire DCE 2006/16 relative à la constitution et à la mise en œuvre du programme de surveillance pour les eaux douces de surface, dans la mesure de ce qui est indiqué dans le présent guide.

La disponibilité des **éléments de qualité les plus sensibles** est à analyser **au regard des pressions** qui sont connues comme s'exerçant ou susceptibles de s'exercer sur la masse d'eau concernée. On pourra se référer à l'annexe de l'arrêté surveillance du 25 janvier 2010 comme cadre d'analyse des éléments les plus sensibles en fonction du type de pression.

La **robustesse des données milieux** peut s'analyser au regard des critères suivants :

S'il s'agit de données obtenues directement :

▪ **1. Chronique des données utilisées pour évaluer l'état écologique**

La règle est d'utiliser l'ensemble des données disponibles pour évaluer l'état écologique. Plus la chronique de données utilisées est importante, plus le niveau de confiance de l'état évalué d'une masse d'eau est élevé³⁰.

Les chroniques de données disponibles issues des réseaux DCE sont désormais généralement plus longues que les 3 ou 6 ans requis pour évaluer l'état d'une masse d'eau cours d'eau ou plan d'eau. Ces données doivent être utilisées systématiquement pour attribuer un niveau de confiance ou pour vérifier une tendance d'évolution ou asseoir un avis d'expert sur des données en limite d'application.

Indépendamment des données aberrantes qui peuvent être observées ponctuellement (et à exclure pour l'évaluation de l'état écologique), des conditions climatiques exceptionnelles sur une période donnée (une année par exemple) peuvent conduire à écarter des données atypiques de la chro-

³⁰ Dans l'attribution du niveau de confiance, on pourra tenir compte de l'éventuelle antériorité de données, au-delà de celles requises sur les 2 ou 6 ans pour évaluer l'état d'une masse d'eau cours d'eau ou plan d'eau.

nique à prendre en compte pour l'évaluation de l'état écologique. La chronique de données étant alors plus réduite cela peut conduire à diminuer le niveau de confiance de l'état écologique évalué.

▪ 2. Cohérence des indications fournies par les compartiments biologiques et la physico-chimie

La cohérence des indications fournies par la biologie et la physico-chimie est un facteur permettant d'augmenter le niveau de confiance de l'état écologique évalué.

▪ 3. Niveau d'incertitude associé à la méthode d'évaluation de l'élément de qualité déclassant déterminant l'état écologique de la masse d'eau

Plus ce niveau d'incertitude est faible, plus le niveau de confiance de l'état écologique évalué est élevé.

S'il s'agit de données issues de modélisation :

- **1. Domaine de validité du modèle :** plus la situation simulée est proche des limites de validité du modèle, moins la robustesse sera élevée. La robustesse sera au contraire maximale dès lors que la simulation sera clairement dans le domaine de validité du modèle ;
- **2. Situation atypique ou exceptionnelle :** les modèles permettent de contrôler les conditions hydro-climatiques simulées. Lorsque ces conditions sont atypiques ou représentent clairement une situation exceptionnelle, la robustesse des résultats sera considérée comme faible ;
- **3. Données d'entrée :** les données d'entrée du modèle (apports, représentation du milieu, etc.) conditionnent grandement la robustesse du résultat. Une faible confiance dans ces données d'entrée entraîne une faible robustesse du résultat de simulation.

Cohérence état / pressions


La cohérence entre l'état évalué à partir des données milieux et les données pressions est un facteur permettant d'augmenter le niveau de confiance de l'état écologique évalué. A l'inverse, une analyse plus poussée est nécessaire en cas d'incohérence constatée en première analyse pour s'assurer de la robustesse des diagnostics (état, incidences des pressions) avant de statuer sur l'état écologique de la masse d'eau : toutes les pressions connues ont-elles été prises en compte et convenablement évaluées ? Les référentiels de l'évaluation ont-ils été convenablement utilisés ? Le site de surveillance est-il bien représentatif de l'état de la masse d'eau dans son ensemble ?

Comme indiqué en annexe 8 ci-avant³¹, si les chroniques de données disponibles ne sont pas suffisamment représentatives de l'état de la masse d'eau dans son ensemble³², il conviendra de tenir compte également du dire d'expert et des informations disponibles sur les pressions et leurs incidences pour statuer sur l'état de la masse d'eau.

³¹ Point 1. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau suivies directement

³² Représentativité du site vis-à-vis de la masse d'eau et des pressions qui s'y exercent, volume de données, éléments de qualité disponibles, etc.

Arbre de décision pour l'attribution d'un niveau de confiance à l'état écologique évalué pour une masse d'eau appartenant à un type donné



* Voir annexe 8 point 4

Annexe 11 : État chimique des cours d'eau et des plans d'eau

Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

Pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.

Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.

Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.

- MA : moyenne annuelle.
- CMA : concentration maximale admissible.
- SDP : substance dangereuse prioritaires.
- SO : sans objet.
- Unités : eau [$\mu\text{g}/\text{l}$] ; biote [$\mu\text{g}/\text{kg pf}$].

Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

N°	Code Sandre	Nom de la substance	Numéro CAS (1)	NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)	NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition	NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)	NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition	NQE Biote (12)	NQE mollusques (17)
(1)	1101	Alachlore	15972-60-8	0,3	0,3	0,7	0,7		
(2)	1458	Anthracène	120-12-7	0,1	0,1	0,1	0,1		173
(3)	1107	Atrazine	1912-24-9	0,6	0,6	2,0	2,0		
(4)	1114	Benzène	71-43-2	10	8	50	50		
(5)	7705	Diphényléthers bromés (5)	32534-81-9			0,14	0,014	0,0085	
(6)	1388	Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)	7440-43-9	≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)	0,2	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)		572
(6 bis)	1276	Tétrachlorure de carbone (7)	56-23-5	12	12	Sans objet	Sans objet		
(7)	1955	Chloroalcane C10-13 (8)	85535-84-8	0,4	0,4	1,4	1,4	16600	
(8)	1464	Chlorfenvinphos	470-90-6	0,1	0,1	0,3	0,3		30,9
(9)	1083	Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)	2921-88-2	0,03	0,03	0,1	0,1		10,32
(9 bis)	5534	Pesticides cyclodiènes: Aldrine (7) Dieldrine (7) Endrine (7) Isodrine (7)	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	∑ = 0,01	∑ = 0,005	sans objet	sans objet		
(9 ter)	7146	DDT total (7), (9)	sans objet	0,025	0,025	sans objet	sans objet		1282
	1148	Para-para-DDT (7)	50-29-3	0,01	0,01	sans objet	sans objet		
(10)	1161	1,2-dichloroéthane	107-06-2	10	10	sans objet	sans objet		
(11)	1168	Dichlorométhane	75-09-2	20	20	sans objet	sans objet		
(12)	6616	Di(2-ethyl hexyle)-phthalate (DEHP)	117-81-7	1,3	1,3	sans objet	sans objet	3200	2920
(13)	1177	Diuron	330-54-1	0,2	0,2	1,8	1,8		
(14)	1743	Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0005	0,01	0,004		
(15)	1191	Fluoranthène	206-44-0	0,0063	0,0063	0,12	0,12	30	
(16)	1199	Hexachlorobenzène	118-74-1			0,05	0,05	10	

N°	Code Sandre	Nom de la substance	Numéro CAS (1)	NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)	NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition	NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)	NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition	NQE Biote (12)	NQE mollusques (17)
(17)	1652	Hexachlorobutadiène	87-68-3			0,6	0,6	55	
(18)	5537	Hexachlorocyclohexane	608-73-1	0,02	0,002	0,04	0,02		0,28
(19)	1208	Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,3	1,0	1,0		
(20)	1382	Plomb et ses composés	7439-92-1	1,2 (13)	1,3	14	14		
(21)	1387	Mercure et ses composés	7439-97-6			0,07	0,07	20	
(22)	1517	Naphtalène	91-20-3	2	2	130	130		214
(23)	1386	Nickel et ses composés	7440-02-0	4 (13)	8,6	34	34		
(24)	1958	Nonylphénols (4-nonylphénol)	84852-15-3	0,3	0,3	2,0	2,0		344
(25)	1959	Octylphénols (4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol)	140-66-9	0,1	0,01	sans objet	sans objet		2,29
(26)	1888	Pentachlorobenzène	608-93-5	0,007	0,0007	sans objet	sans objet	367	2,29
(27)	1235	Pentachlorophénol	87-86-5	0,4	0,4	1	1		41,6
(28)		Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet		
	1115	Benzo(a)pyrène	50-32-8	$1,7 \times 10^{-4}$	$1,7 \times 10^{-4}$	0,27	0,027	5	
	1116	Benzo(b)fluoranthène	205-99-2	voir note 11	voir note 11	0,017	0,017	voir note 11	
	1117	Benzo(k)fluoranthène	207-08-9	voir note 11	voir note 11	0,017	0,017	voir note 11	
	1118	Benzo(g,h,i)perylène	191-24-2	voir note 11	voir note 11	$8,2 \times 10^{-3}$	$8,2 \times 10^{-4}$	voir note 11	
	1204	Indeno(1,2,3-cd)-pyrène	193-39-5	voir note 11	voir note 11	sans objet	sans objet	voir note 11	
(29)	1263	Simazine	122-34-9	1	1	4	4		
(29 bis)	1272	Tétrachloroéthylène (7)	127-18-4	10	10	sans objet	sans objet		
(29 ter)	1286	Trichloroéthylène (7)	79-01-6	10	10	sans objet	sans objet		
(30)	2879	Composés du tributylétain (tributylétain-cation)	36643-28-4	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015		
(31)	1774	Trichlorobenzène	12002-48-1	0,4	0,4	sans objet	sans objet		100,4
(32)	1135	Trichlorométhane	67-66-3	2,5	2,5	sans objet	sans objet		

N°	Code Sandre	Nom de la substance	Numéro CAS (1)	NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)	NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition	NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)	NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition	NQE Biote (12)	NQE mol-lusques (17)
(33)	1289	Trifluraline	1582-09-8	0,03	0,03	sans objet	sans objet		116
(34)	1172	Dicofol	115-32-2	$1,3 \times 10^{-3}$	$3,2 \times 10^{-5}$	sans objet (10)	sans objet (10)	33	
(35)	6561	Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS)	45298-90-6	$6,5 \times 10^{-4}$	$1,3 \times 10^{-4}$	36	7,2	9,1	
(36)	2028	Quinoxifène	124495-18-7	0,15	0,015	2,7	0,54		
(37)	7707	Dioxines et composés de type dioxine (15)				sans objet	sans objet	Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ TEQ (14)	
(38)	1688	Aclonifène	74070-46-5	0,12	0,012	0,12	0,012		
(39)	1119	Bifénox	42576-02-3	0,012	0,0012	0,04	0,004		
(40)	1935	Cybutryne	28159-98-0	0,0025	0,0025	0,016	0,016		
(41)	1140	Cyperméthrine	52315-07-8	8×10^{-5}	8×10^{-6}	6×10^{-4}	6×10^{-5}		
(42)	1170	Dichlorvos	62-73-7	6×10^{-4}	6×10^{-5}	7×10^{-4}	7×10^{-5}		
(43)	7128	Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)		0,0016	0,0008	0,5	0,05	167	
(44)	7706	Héptachlore et époxyde d'hép-tachlore	76-44-8/ 1024-57-3	2×10^{-7}	1×10^{-8}	3×10^{-4}	3×10^{-5}	$6,7 \times 10^{-3}$	
(45)	1269	Terbutryne	886-50-0	0,065	0,0065	0,34	0,034		

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "Diphényléthers bromés" (n°5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO 3 /l; classe 2: 40 à < 50 mg CaCO 3 /l; classe 3: 50 à < 100 mg CaCO 3 /l; classe 4: 100 à < 200 mg CaCO 3 /l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO 3 /l.

(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 50-29-3; n° UE: 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 789-02-6; n° UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS: 72-55-9; n° UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 72-54-8; n° UE: 200-783-0).

(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)" (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14) PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

(15) Se rapporte aux composés suivants:

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5'-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5'-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5'-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..

(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.

ANNEXE 12 : ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉFINIR LES ACTIONS ET SUIVRE LEURS EFFETS

Comme précisé en préambule du présent guide, les règles d'évaluation de l'état des eaux font partie des éléments à considérer pour déterminer les actions à mettre en œuvre en application de la DCE et suivre leurs effets. La démarche de définition de ces actions et de suivi de leurs effets n'est pas traitée dans le présent guide ; elle nécessite de considérer un panel d'informations complémentaires.

La présente annexe fournit des éléments à utiliser pour interpréter les résultats de la surveillance de l'état des eaux (données relatives au milieu), en complément des règles de classification de l'état des masses d'eau. Elle ne vise pas l'exhaustivité en la matière.

1. Éléments à prendre compte pour le diagnostic

1.1. Paramètres et valeurs-seuils³³

Les paramètres et valeurs-seuils à utiliser pour interpréter les résultats de la surveillance sont ceux de l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010, précisés dans les annexes du présent guide. Des paramètres et valeurs-seuils complémentaires peuvent être pris en compte pour déterminer et suivre les actions des programmes de mesures DCE et des autres dispositifs de planification dans le domaine de l'eau, ainsi que pour l'instruction des projets d'installation, ouvrages, travaux et activités soumis à la police de l'eau ou des installations classées.


Les éléments suivants sont à utiliser en tant que paramètres complémentaires en fonction des problématiques considérées :

- Concernant la physico-chimie générale en cours d'eau :

PARAMÈTRES	LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ÉTAT
BILAN DE L'OXYGENE	
DCO (mg/l O ₂)]20 - 30]
NKJ (mg/l N)]1 - 2]
PARTICULES EN SUSPENSION	
MES (mg/l)]25 - 50]
Turbidité (NTU)]15 - 35]
EFFETS DES PROLIFERATIONS VEGETALES	
Chlorophylle a + phéopigments (µg/l)]10 - 60]
Taux de saturation en O ₂ dissous (%)]110 -130]
pH (unité pH)]8 - 8,5]
ΔO ₂ (mini-maxi) (mg/l O ₂)]1 - 3]
ACIDIFICATION	
Aluminium (dissous) (µg/l)	
pH ≤ 6,5]5 - 10]
pH > 6,5]100 - 200]

³³ Ces paramètres et valeurs-seuils sont également donnés dans le guide technique du MEDDE du 13 décembre 2012 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l'eau dans les pratiques des services de police en charge des IOTA et des ICPE .

- **Concernant les micropolluants** autres que les substances visées par l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010, les données de surveillance sont à interpréter à partir :
 - pour les micropolluants/substances non visées par l'arrêté évaluation du 25 janvier 2010 modifié mais potentiellement dangereuses, des valeurs guides environnementales (VGE) sont disponibles sur le Portail Substances Chimiques³⁴. Il s'agit de valeurs scientifiques non réglementaires qui doivent aider à évaluer un enjeu ponctuel lié au dépassement de cette valeur seuil.
 - Pour permettre une analyse plus poussée, il est possible de s'appuyer sur les outils de diagnostic comme les indicateurs gradués et agrégés de l'évaluation des risques écotoxicologiques : ces indicateurs sont gradués selon une grille d'interprétation multi-classes (5 classes) afin de relativiser le risque et de proposer une analyse plus fine qui ne ressort pas avec l'évaluation de l'état binaire (bon/mauvais état, « one out/all out ») tel que prévu actuellement par la DCE. Trois Indicateurs gradués d'Évaluation de l'État des Eaux de surface vis-à-vis de potentiels risques environnementaux/écotoxicologiques différents sont proposés relativement à (i) des expositions chroniques ou (ii) des expositions ponctuelles et (iii) pour chaque substance, un indicateur gradué permettant de rapporter l'évaluation de la qualité des eaux à la station pour l'agrégation des substances présentes sur le site de mesure et basé sur la sensibilité de taxons appartenant à 3 niveaux trophiques différents (Rapport INERIS, publication prévue fin 2018).
- **Concernant l'hydrobiologie**, l'interprétation des données collectées doit permettre de calculer les valeurs des indicateurs biologiques pertinents, mais des compléments d'interprétation sont nécessaires pour pousser le diagnostic au-delà de l'attribution d'une classe d'état :
 - par exemple, un document d'incidences ou une étude d'impact doit analyser les caractéristiques des peuplements en terme de composition et de structure des peuplements, de structure des populations (poissons) et d'abondance taxinomique (et de structure d'âge pour les communautés piscicoles), et interpréter les résultats pour analyser l'état initial du milieu et les incidences prévisibles du projet.
 - Pour permettre une analyse plus poussée, il est possible de s'appuyer sur les outils de diagnostic disponibles comme par exemple, pour les cours d'eau, l'outil diagnostic invertébrés ou l'outil diagnostic diatomées. Pour chaque opération de contrôle, ces outils de diagnostic peuvent produire un tableau récapitulatif des probabilités d'altération pour chaque type de pression pris en compte (par exemple, en fonction de l'outil de diagnostic : les matières organiques et oxydables, les matières azotées hors nitrates, les nitrates, les matières phosphorées, les matières en suspension, l'acidification, les micropolluants minéraux, les pesticides, les HAP, les micropolluants organiques, les voies de communications, la ripisylve, l'urbanisation, le risque de colmatage, le risque d'instabilité hydrologique, la rectification) ainsi qu'une sortie graphique composée de diagrammes en radar (schéma ci-après).



³⁴ accessible à l'adresse suivante <http://www.ineris.fr/substances/fr/>

L'outil IPR+ peut également être utilisé en tant qu'outil d'aide au diagnostic en plus du résultat de l'IPR pour les zones à truite ou les sites multi-impactés par l'hydromorphologie.

L'outil IIR (indice ichtyofaune pour les retenues) peut quant à lui être utilisé en tant qu'outil d'aide au diagnostic pour les retenues. Plus de détails relatifs à son utilisation sont disponibles dans le guide méthodologique de calcul de l'indice ichtyofaune pour les retenues (IIR) de Miguet Paul, Maxime Logez, et Christine Argillier, 2018.

A terme, afin d'envisager un diagnostic intégré des masses d'eau, prenant en compte l'ensemble des éléments de qualité biologiques, la boîte à outils de diagnostic sera complétée par d'autres outils équivalents à ceux déjà existants pour les compartiments diatomées en cours d'eau et invertébrés en cours d'eau.

Les outils web permettant les calculs des outils de diagnostic seront disponibles au fur et à mesure sur le site du SEEE. Actuellement, l'outil diagnostic invertébrés et l'IPR+ y sont disponibles.

- Concernant l'hydromorphologie, le suivi à mettre en œuvre et l'interprétation des résultats (paramètres et méthodes de description) reposent sur un diagnostic pour identifier les altérations hydromorphologiques existantes (ou prévisibles, par exemple celles décrites dans l'étude d'impact d'un projet) et les altérations écologiques résultantes au regard des pressions étudiées. Les guides d'aide à la définition d'un diagnostic hydrogéomorphologique, d'une étude de suivi et des recommandations pour les opérations de restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau (AFB, agences de l'eau), pourront être utilement consultés. Le Centre national de restauration des rivières constitue le centre de ressources idoine pour consulter les nombreux guides disponibles à ce jour et échanger en réseau sur les pratiques et expériences de la restauration physique des cours d'eau (restauration d'annexes alluviales, restauration de la géométrie, restauration de la dynamique fluviale, restauration de la continuité écologique, réhabilitation des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides associés etc.).

1.2 Connaissance des pressions et des impacts

La connaissance des pressions et des impacts est également nécessaire pour porter un diagnostic sur les milieux aquatiques, en complément de la connaissance de l'état du milieu. Ces éléments ne sont pas traités dans le présent guide, mais quelques indications sont fournies ci-dessous.

Les données de base à utiliser sont celles relatives aux pressions et aux impacts existants dans les documents de planification du bassin (États des lieux et SDAGE) identifiant les principales pressions par masse d'eau ou par sous-bassin versant, ainsi que les données du rapportage européen (à la masse d'eau). Les actions prévues au programme de mesures fournissent également une indication des principaux types d'impact qu'il est considéré nécessaire de réduire pour atteindre les objectifs des masses d'eau.

- Concernant les micropolluants, l'obligation européenne de dresser un inventaire des émissions, rejets et pertes des substances dangereuses à l'échelle de chaque district hydrographique (grand bassin versant) fournit une information agrégée sur les pressions significatives. L'information peut être disponible à une échelle plus fine, dans les états des lieux ou directement dans des bases de données spécifiques comme : le registre des émissions polluantes (i-rep), la base GIDAF relative à la gestion informatisée des données d'auto-surveillance fréquente et/ou la base de données de l'action RSDE pour les ICPE hébergée par l'INERIS et ros'eau pour les STEU.

- Concernant l'hydromorphologie, SYRAH-CE fournit une description cartographique des pressions et des risques d'altérations hydromorphologiques d'un cours d'eau (pour la métropole), à large échelle, à l'échelle des tronçons hydromorphologiques, en fonction du type de cours d'eau concerné. Ces données sont accessibles sur le portail EauFrance (www.eaufrance.fr). Pour les RUP, l'outil RHUM (Référentiel hydromorphologique ultramarin) est mobilisable. Ces systèmes constituent un premier niveau d'analyse (pré-diagnostic), et doivent être nécessairement complétés par d'autres approches spatiales et méthodes, incluant si possible la dimension temporelle, et identifiant les processus physiques et leur altération possible.

Ces données sont à corroborer par la connaissance locale des pressions.

2. Éléments à prendre compte pour montrer l'effet des actions mises en œuvre sur l'état des eaux

2.1. L'état des eaux : un indicateur intégrateur des effets des pressions cumulées sur le milieu

L'état écologique des eaux constitue un indicateur synthétique et agrégé, la biologie étant intégratrice des effets des pressions cumulées. Son amélioration significative nécessite de mettre en œuvre le programme de mesures sur les différents types de pressions en cause dans les dégradations, et ne peut être observé qu'avec un délai de réponse du milieu à ces évolutions des pressions.

Dans le même temps, il est nécessaire de montrer l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre et de répondre aux questions des acteurs de l'eau et du public sur les résultats des actions publiques.

Il apparaît donc indispensable de distinguer les évolutions de l'état des eaux :

- à différentes échelles spatiales et temporelles ;
- mais également en termes de thématiques (pollution, hydromorphologie...) et de niveau d'agrégation des paramètres de l'évaluation.

Pour cela, différents types d'analyses et de réponses peuvent être couplés.

2.2. Montrer l'amélioration de la qualité des eaux par des chroniques longues sur des paramètres ciblés sur les effets attendus de ces actions

Il convient de mettre en évidence les résultats des actions de grande ampleur menées sur les territoires, notamment en matière de lutte contre les pollutions ponctuelles domestiques et industrielles dont l'application de la directive ERU.

D'importantes améliorations de la qualité des eaux sont ainsi constatées, sur des paramètres en lien avec ces actions mises en œuvre, et sur une période de temps suffisamment longue pour observer des évolutions significatives de l'état de ces paramètres, comme le montrent les exemples suivants concernant la pollution des cours d'eau par les macro-polluants.

Au niveau national, les analyses menées par le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du MTES mettent en évidence une **nette diminution depuis une dizaine d'années de la pollution des cours d'eau par les matières organiques et phosphorées**, issues des rejets urbains

et industriels, tandis que **celle due aux nitrates**, majoritairement d'origine agricole, **ne diminue pas à l'échelle nationale**³⁵.

Au niveau des bassins, de telles améliorations sont également observées. On observe ainsi, par exemple dans le cas des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse³⁶ :

- une division par 10 des concentrations en ammonium, paramètre indicateur du niveau de traitement des eaux usées, dans les cours d'eau suite à la mise en œuvre de la directive ERU. En 20 ans ce paramètre est ainsi passé d'une qualité médiocre à bonne dans la plupart des cours d'eau du bassin
- une division par 10 des concentrations en phosphore dans les cours d'eau depuis le début des années 1990, contribuant à une nette amélioration de la qualité des cours d'eau et à la réduction de leur eutrophisation. La qualité vis-à-vis de ce paramètre est passée de mauvaise à bonne.

2.3. Montrer l'efficacité des actions de restauration par des suivis ciblés sur certaines actions de restauration mises en œuvre

L'atteinte des objectifs environnementaux de la DCE nécessite la mise en œuvre d'actions notamment de lutte contre les pollutions diffuses et de restauration physique et de réhabilitation du bon fonctionnement hydromorphologique des milieux aquatiques.

Les travaux de restauration hydromorphologique des cours d'eau consistent à réhabiliter totalement ou partiellement les fonctions des cours d'eau, par exemple par : l'effacement ou l'aménagement des ouvrages hydrauliques pour restaurer la continuité écologique, la restauration de la dynamique sédimentaire et le rétablissement de la connectivité avec les autres milieux naturels – y compris les nappes alluviales et les zones humides -, la dérectification, la remise dans le talweg, la reconnexion d'annexes hydrauliques, la suppression de contraintes latérales, la remise à ciel ouvert de cours d'eau, l'augmentation des fréquences de débordement du lit mineur vers le lit majeur etc. Ces travaux concernent également les interventions dans le bassin versant, siège des usages et des pressions qui conduisent à la dégradation des milieux aquatiques (implantation de haies pour réduire les apports de particules fines, restauration de ripisylve suffisante, réduction du ruissellement accru par les usages existants tels que l'urbanisation,...).

Ces travaux contribuent à l'atteinte du bon état écologique, conjointement à la suppression des pollutions et à la réduction des prélèvements, dans la mesure où ils favorisent l'abondance et la diversité des habitats et des éléments biologiques, l'apport d'éléments nutritifs (déchets végétaux), les facteurs d'ambiance favorables pour les habitats, ainsi que l'auto-épuration des eaux.

Comme le montre le rapportage à mi-parcours des programmes de mesures, il existe d'importants freins à leur mise en œuvre, en particulier :

- Techniques (connaissance, complexité, dimensionnement des actions, réponse des milieux...);
- Juridiques et réglementaires ;
- Financiers (coûts disproportionnés, difficultés à mobiliser des aides pour les agriculteurs) ;
- Sociologiques (acceptation).

³⁵ http://statistiques.developpement-durable.gouv.fr/vpn.e2.rie.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Referencess/2014/ree-2014/ree2014-chapitre1-souspartie1.pdf

³⁶ Ces exemples sont issus du document : L'état des eaux des bassins Rhône-Méditerranée et Corse, Situation 2010. www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/brochures_d_information/RapportEtatdesEauxSituation2010.pdf

Cependant, les intérêts et les bénéfices multiples de la restauration des milieux sont de mieux en mieux reconnus par les acteurs de l'eau sur leurs territoires. Il convient d'accompagner ces opérations de restauration par de la pédagogie, de l'explication adaptée au public cible, de l'argumentation des objectifs, de la démonstration des résultats attendus à court, moyen et plus long termes, et de l'intégration des populations riveraines à ces projets de territoire de l'eau.

Il est par exemple recommandé de mettre en perspective des réalisations, des résultats d'actions mises en œuvre localement ou à plus large échelle, par des suivis ciblés sur certaines actions de restauration. Le choix de ces actions et des modalités de leur suivi est à adapter en fonction des problématiques considérées.

ANNEXE 13. REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES MASSES D'EAU EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MESURES DE LA DCE

On peut distinguer quelques grandes catégories de situations, selon différents niveaux de pressions correspondant à différents types d'enjeux pour le programme de mesures :

1. Milieux en très bon état écologique : à préserver pour eux-mêmes et pour leur rôle fonctionnel

La reconquête du bon état écologique des masses d'eau nécessite de disposer de suffisamment de milieux préservés, au niveau de leur structure (diversité biologique...) et de leur fonctionnement écologique (notions d'hydrodynamique, d'habitats...), bien répartis sur le territoire, pour jouer efficacement leur rôle de réservoir biologique.

L'enjeu pour les programmes de mesures de la DCE est de préserver ou de restaurer ces milieux, qui peuvent inclure :

- les masses d'eau évaluées en très bon état écologique selon les critères du présent guide ;
- d'autres masses d'eau ou d'autres milieux aquatiques fonctionnellement liés (milieux humides annexes, affluents ou tronçons de cours d'eau), qui ne remplissent pas forcément tous les critères du très bon état écologique DCE sensu stricto, mais dont la structure et le fonctionnement écologique sont suffisamment préservés pour jouer un rôle fonctionnel de réservoir biologique.

2. Milieux sévèrement dégradés (état mauvais, médiocre, ou moyen proche du médiocre)

Ces milieux sont soumis à une ou à des pressions de forte intensité, généralement bien identifiées. Les principales actions à mener pour améliorer l'état de ces milieux sont dès lors elles aussi, en général, bien identifiées.

La réduction de ces pressions fortes peut s'avérer nécessaire, outre pour améliorer l'état de la masse d'eau sur laquelle s'exerce(nt) directement cette ou ces pressions fortes, mais également pour contribuer à l'atteinte du bon état d'autres masses d'eau liées (répercussion possible des impacts à l'amont ou à l'aval).

3. Milieux en état moyen, proches du bon état

Les enjeux pour les programmes de mesures sont similaires pour les masses d'eau figurant dans cette catégorie, quel que soit le résultat précis de l'évaluation de leur état. Il convient de réduire les pressions s'exerçant sur ces masses d'eau pour améliorer la qualité de leur structure et de leur fonctionnement écologique.

Si le détail de la justification de l'action au titre de la DCE diffère, sa nécessité demeure :

- dans un cas, il convient d'agir au titre de la non-détérioration (masse d'eau identifiée en état bon mais limite, donc en risque de dégradation) ;
 - dans l'autre cas il convient d'agir au titre de l'atteinte de l'objectif de bon état (cas d'une masse d'eau évaluée en état moyen avec un objectif de bon état).
-

REMERCIEMENTS

La réactualisation de guide technique pour l'évaluation de l'état des eaux de surface continentales a été réalisée avec la contribution des membres des groupes de travail nationaux (GT eaux de surface continentales, GT hydromorphologie, GT plans d'eau et GT substances) issus des agences et offices de l'eau, de l'agence française pour la biodiversité, d'organismes de recherche (CEREMA, IRSTEA, INERIS), du laboratoire national de référence sur la surveillance des milieux aquatiques AQUAREF, d'universités (Université de Lorraine), et du ministère de la Transition écologique et solidaire (services déconcentrés et administration centrale).

**Ministère de la Transition écologique
et solidaire**

Direction générale de l'aménagement,
du logement et de la nature

Direction de l'eau et de la biodiversité

Sous-direction de la protection et de la gestion de l'eau,
des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques

Tour Séquoia
92055 La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 40 81 21 22

